dulis nec erectis, foliis profunde quinquelobis dentatis, non integerrimis. Ab *acero opulo* differt magnitudine, corymbis pendulis nec laxis erectis, foliis subtus glauco-pubescentibus, profunde-quinquelobis acutis, non subtus glabris laevissime quinquelobis obtusis, alis samararum patentibus, non approximatis. Ab *A. opulifolio* Villarsii differt foliis subtus pubescentibus, non glabris, alis samararum semipatentibus minime approximatis, ligno albo evene, haud flavo venosiore, magnitudinae, aliisque notis.

184. *Atriplex diffusa*. Caule herbaceo procumbente ramosissimo, foliis deltoidibus, triangulari-lanceolatisque, obtusissimis subsinuatis, calycibus fructus deltoideo-hastatis, auriculatis dentatis, disco laevi, floribus spicatis. Annua. *Pr. p. lvii.*

Habitat in arena litoris prope Bajas.

185. *Marsilea pubescens*. Foliis quaternis integerrimis pubescentibus; fructibus sessilibus aggregatis villosis. Perennis. *Prodr. sup. pag. lxx.*

Habitat in inundatis Lucaniae, in loco vulgo dicto, *Oliveto di S. Basile*: prope *Pisticcium*.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

AD

CATALOGUM

PLANTARUM

HORTI REGII NEAPOLITANI

ANNO 1813 EDITUM.

APPENDIX PRIMA.

EDITIO ALTERA.

NEAPOLI

EX TYPOGRAPHIA DIARII ENCYCLOPEDICI

1819.

BOTANICES STUDIOSIS.

Miraberis fortasse, benevole Lector, quod vix, vel ne vix quidem exactis duobus annis ab hujus Regalis Horti Neapolitani plantarum Catalogi evulgatione, nova accessione adauctum eumdem prodam. Sed numerum adcquisitarum, hoc temporis intervallo, plantarum, Botanices in dies incrementum, ac denique grati animi officium, Catalogi nostri praepoperam amplificationem tu ipse postulare fateberis. Quum enim herbarum ac seminum, quod inter me et praeclarissimos viros Botanices cultores, per totam fere Europam dissitos, institutum fuit commercium, ea felicitate processerit, ut mille et biscentum praeter eas, quae in Catalogo continentur, plantae, jam hortum nostrum locupletarunt, earum numerum haud spernendum publici juris minime facere piaculum erat. In hoc autem peragendo illud procul dubio negligendum non erat; quod grati animi testimonium iis praeclarissimis viris praebere mens sit, a quibus eas accepimus. Inter eos honoris gratia, in antecessum recensendos opinor Dominos ac Doctores Fischerum, Juntiltium, Luykenium, Hoppeum, Jacquinum, Roemerium, Thouinum, Decandollium, Dejean, Noccam, Balbisium, Harmanum, Harduinum, Scannagattum, Targionem-Tozzetti, Savium ac Tineum, qui *Moschae*, *Vilnae*, *Berolini*, *Amstelodami*, *Monachii*, *Vindobonae*, *Tiguri*, *Parisiis*, *Monspelii*, *Lugduni*, *Papiae*, *Taurini*, *Mediolani*, *Patavii*, *Bononiae*, *Pisis*, *Panormi*, *Gorenkiano*, aut Imperialibus, vel Regiis Hortis, summa cum laude praesunt. Nonnulla insuper pro horto sicco, a clarissimis viris *Pearsonio*, *Sprengelio*, *Schleicherio*, *Moricando*, *Sebastianio*, aliosque quos silentio praeteream, nec tedio tibi sim, accepimus.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Iis omnibus gratias perquam maximas, et meo, et discipulorum meorum, nec non totius Gentis nostrae nomine reddendas esse quis dubitat, quum tanta liberalitate, ac diligentia mihi praesto fuerint, et aliquando ultra spem mihi faverint? Porro eadem indulgentia eos me in posterum prosecuturos esse cupio, oro, obtestorque; ut illud demum, quod mihi cordi est, consequar, nempe ut et perfectionis fastigium Hortus Neapolitanus assurgat, feliciter Regnante Principe, cujus auspiciis ejus institutio, et prima incrementa debentur.

Praeter appendicem, de qua supra locuti sumus, aliam addendam duxi, in qua plantas illas quarum sicca specimina in meo herbario existunt enumeravi, quasque in Horto Regio colere hujusque non licuit; tum notas characteristicas, passim observationibus interjectis, novarum specierum a me detectarum exposui; quod quidem eo consilio faciendum curavi, ut ope indicationis plantarum indigenarum, quem nunquam in meo Catalogo neglexi, summa plantarum, quae in *Florae Neapolitanae Prodromo* continentur, facilius innotescat, et facillime indicem tibi consulenti pateat et reperiatur.

Vale, Lector Benevole.

Dabam Neapoli, Kalendis Septembris anno 1815.

Michael Tenore,
In Regia Universitate Botanices Professor,
ac Horti Regii Praeses.

AD NOTARUM EXPLICATIONEM APPENDIX.

Ait. Aiton.
Bernh. Bernhardi.
Bern. ab Ucr. Bernardinus ab Ucria.
Biebr. Biebrestein.
Biv. Bivona.
Bon. Bonpland.
Bosc. Boscii.
Brouss. Broussonet.
Curt. Curtis.
Desv. Desvaux.
Dun. Dunal.
Fisch. Fischer.
Hall. Halleri filius.
Haw. Hawart.
Henk. Henke.
Hor. Hornemann.
H. Cantab. Hortus Cantabricensis
H. Dorp. Hortus Dorpatensis in impero Rutheno.
H. Hafn. Hort. Hafniensis.
H. Hal. Hortus Halensis.
H. Lund. Hort. Lundensis in regno svecico.
H. Kew. Hortus Kewensis.
H. Malma. Hortus *de la Malmaison.*
H. Mass. Hort. Massiliensis.
H. Med. Hortus Mediolanensis.
H. Mon. Hort. Monachiensis.
H. Pan. Hort. Panormitanus.
H. Pis. Hort. Pisanus.
H. Vil. Hort. Vilnensis.
H. Vind. Hort. Vindobonensis.
Jacq. fil. Jacquini filius.
La peyr. La peyrouse.
L. fil. Linnaei filius.
Nois. Noissete.
Pour. Pourret.
Redout. Redoutè.
Schot. fil. Schotti filius.
Schul. Schultes.
Sebast. Sebastiani.
Stev. Stevens.
Targ. Targioni.
Thuil. Thuillier.
Tin. fil. Tinaei filius.
Wil. Wildenowii species; in aliis operibus, quam in Sp. pl. vel Enum. pl. traditae.
* Planta indigena.
† Planta incertae originis.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

AD

CATALOGUM

PLANTARUM

HORTI REGII NEAPOLITANI

APPENDIX PRIMA.

A A A

Acacia eburnea
juliflora
linifolia
longifolia
lophantha
obliqua
tetragona
Acer montanum
monspessulanum *
opulifolium *Vill.*
pensylvanicum
Achillea aegyptiaca
anthemoides
croatica *H. Vind.*
flosculosa
lanata
longifolia *H. Vind.*
Achillea sericea *H. Vind.*
serrata
tenuifolia
Achyranthes porrigens
Acorus gramineus
Adoxa moschatellina *
Agave foetida
lurida
Agrostis dispar *Mich.*
serotina *
Aira aquatica *
discolor *Thuil.*
glauca
juncea *Vill.*
praecox
subspicata
Allium angulosum
Allium atropurpureum
baicalense
danubiale *Schrad.*
nigrum
obliquum
ramosum
rubens
tataricum
Alnus incana
Alopecurus nigricans *H. Ber.*
Alyssum gemonense
Amaranthus incarnatus †
incomptus
Amaryllis Reginae

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

A

Amyrola nitida
Amomum repens
Amorpha
Ludvisii †
Anarrhinum
bellidifolium
Anchusa
ochroleuca
Ancistrum
latebrosum
Andromeda
axillaris
coriacea
humilis †
membranacea
Nois.
nitida
oleaefolia
Nois.
paniculata
polifolia
latifolia
racemosa
ventricosa †
Andropogon
contortum †
provinciale
Andriala
chondrylloides
Anemone
nemorosa *
ranunculoides *
Angelica
atropurpurea
verticillaris

A

Annona
tripetala
Anthemis
coronopifolia
ptarmicaefolia
H. Paris.
Triumfetti
All. *
Anthericum
longiscapum
Antholyza cunonia
Anthoxantum
amarum
Brot.
Apargia
crispa
Apium
petroselinum
— *var. tuberosum.*
Apocynum
venetum
Aquilegia
atropurpurea
viridiflora
Arabis montana
Encycl. *
Aralia spinosa
Arbutus
andrachne
Arctotis
el tior
plantaginea
Arenaria
laricifolia
setifolia
H. Vind.

A

Aristolochia
pallida *
pistolochia
Aristotelia
Macqui
Arnopogon
capense
Artemisia
biennis
siversiana
Arundo tenella
Shrad.
Asclepias
amoena
Asparagus
albus *
amarus *DC.*
aphyllus
officinalis
— *var. maritimus*
Asphodelus
fistulosus
— *var. minor.*
Aster
althaicus
carolinianus
chinensis
— *var. minor.*
lanceolatus
sibiricus
Astragalus
eriocephalus *
Athamantha
condensata
sicula *

A

Athanasia
trifurcata
Atraphaxis
undulata
Atriplex
microcapa
H. Monsp.
Atropa
frutescens
umbellata
Aucuba
japonica
Avena
elatior *
latifolia
H. Vind.
Loeflingiana*
nuda
sativa *var. heteromalla*
sempervirens *
Axyris prostrata
Ayenia
pusilla
Azalea
floribunda †
glauca
humilis †
pontica
tomentosa *
viscosa

B

Banksia ilicifolia
praemorsa

B

Banksia
prostrata †
Begonia
dichotoma
hirsuta
Berberis sibirica
Betonica orientalis *Thuil.*
Bidens nivea
pauciflora
H. Paris.
Bignonia stans
Biscutella
auriculata *
Columnae
Nob. *
Blechnum
boreale *
Borya acuminata
Brassica alpina *
Gravinae
Nob. *
Bromus
agrestis *
commutatus
erectus *
giganteus
grossus *
laxus *Wil.*
longiflorus
Will.
maximus
Desf. *
purgans
rubens
stipoides
turgidus

B

Bromus villosus
H. Monsp.
volgensis
H. Ber.
Brunia
lanuginosa
Bubon
bucktormense
Spr.
Budleja globosa
salvifolia

C

Cacalia
Forskalii
H. Monsp.
suaveolens
Cactus
prysmaticus
Desf.
repandus
Caesalpinia
Sappan
Caladium
arborescens
Calceolaria
pinnata
Calendula
arragonica
H. Vil.
Campanula
barbata
divergens
lamiifolia *Spr.*
macrostachya
rapunculoides

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

C C C

Campanula
spathulata
Kit.
Capsicum
gibbosum
H. Monsp.
sinense
Cardamine amara*
sylvatica *
Cardiospermum
corindum
Carduus
carlinaefolius*
lycopifolius
polyanthemos
radiatus
Carex
ampullacea *
extensa *
Oederi *
ovalis
pallescens *
paniculata *
polystachya *
pseudo-cyperus
punctata *
secalina
stellulata *
umbrosa *
Carthamus
creticus
Cassia Canca
Cathartocarpus
Fistula
Caucalis
humilis *

Caucalis
orientalis
pulcherrima
Celosia
albida
comosa
Celsia
orientalis
Celtis cordata
Tournefortii
Cenchrus
tribuloides
Centaurea
althaica
H. Vind.
argentea
aurea
calocephala
intybacea
macrocephala
peregrina
pratensis *
tatarica
tenuiflora
Biebr.
Vochinensis
H. Vind.
Cerastium
brachypetalum *
Cercis
siliquastrum
— *var. fl. albo*
Cestrum
foetidum
H. Paris

Chaerophyllum
coloratum *
hybridum
Nob. *
Cheiranthus
angustifolius
DC.
littoreus
taraxacifolius
Chelidonium
hybridum
laciniatum
Chelone
glabra
Chenopodium
chartaginense
Zucc.
crassifolium
Roth.
ficifolium
lanceolatum
opulifolium
Desf.
setigerum
DC.
villosum
Chloris barbata
ciliata
compressa
DC.
fasciculata
Desf.
pennicillata
scoparia
Lmk.
squarrosa
H. Monsp.

C C C

Chrysanthemum
achilleae
carinatum
graminifolium *
Cichorium
pumilum.
Circaea alpina
Cissampelos
smilacina
Cissus antartica
Clematis
flammula *
Clerodendron
fragrans
Cnicus acaulis
cernuus
ciliatus
Cochlearia
danica
Commarum
palustre
Commelina
bengalensis
longicaulis
parviflora *Zea*
Convallaria
verticillata
Convolvulus
batatas
— *var.minor.*
dissectus
evolvuloides
Conyza
carolinensis
patula
verbascifolia *

Corchorus
japonicus
multisiliquosus
Coreopsis
chrysantha
diversifolia
verticillata
Cornus alba
mascula
fr. luteo
Coronilla
cretica
picta
vaginalis*
Corylus colurna
Cotyledon
Jussiaei †
Crambe
cordifolia †
maritima
Crassula
flava
Crataegus
latifolia *Lmk.*
racemosa
Lmk.
Crepis bannatica
biennis *
lacera *Nob.* *
lappacea
latifolia
leontodontoides
raphanifolia
Wil.
rigida

Crepis rubra
— *var. minor.*
taraxacifolia
Crotalaria
orientalis
H. Viln.
purpurascens
Crucianella
molluginoides
Crypsis
schoenoides
Cucubalus
acynoides
H. Paris
Curcuma longa
Cyclamen
persicum
Cynanchum
erectum
Cynoglossum
angustifolium
bicolor
magellense
Nob. *
Cynosurus
cristatus
— *var. aristis violac.* *
Cyperus
acutiusculus †
alternifolius
esculentus
ligularis
mucronatus
spectabilis
Schrad.
tetrastachyos *

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

C

Cytisus
Laburnum
latifolius
paniculatus
Kit.

D

Dactylis
glaucescens *
Dalechampia
scandens
Daphne Gnidium
pontica
sinensis †
Datisca
cannabina
Datura
ceratocaula
Daucus
lucidus
Delphinium
anomalum †
azureum
grandiflorum
hybridum
revolutum
H. Paris.
urceolatum
Dianthus
alpestris
attenuatus
bicolor
Biebr.
caesius
capitatus
glaucus

D

Dianthus
hortensis
libanotis
petraeus
ochroleucus
ruthenicus
H. Hal.
Digitalis lanata
obscura
Rothii
H. Vind.
Digitaria ciliaris
Dillenia scandens
Diosma
imbricata
Dipsacus
ferox *Lois.*
Disodium
divaricatum
Dolichos
lablab
— var. fr. albo
odoratus †
Dorycnium
monspeliense
Dracoena Draco

E

Echinops
paniculatus
Jacq. fil.
Echium
candicans
densiflorum
DC.
giganteum

E

Echium
parviflorum *
Ehretia
Bourreria
Eleusine
filiformis
Elymus
geniculatus
giganteus
glaucifolius
mexicanus
H. Vind.
tener
Epilobium
coloratum
origanifolium
Equisetum
sylvaticum *
Erianthus
saccharoides
Erigeron
phyladelphicum
uniflorum
Eriophorum
polystachyum *
Erodium
maritimum
pimpinellifolium *
Ervum lentoides
Nob. *
Eryngium
aquaticum
corniculatum
dichotomum

E

Eryngium
oliverianum
Laroche
Erysimum
arenarium
Vincens
Erythryna
speciosa
H. R. Cas.
Eucalyptus
resinifera
Eugenia
Jambos
Eupatorium
altissimum
Euphorbia
androsemifolia
H. Vind.
dendroides *
heptagona
juncea
paniculata *
prunifolia
W. enum.
thymifolia
tithymaloides
myrtifolia
padifolia
valentina
Evonymus
europaeus
fr. albo

F

Fabricia laevigata

F

Fagonia
cretica
Ferula ferulago
nodiflora *
Festuca
alopecurus *
Pers. ciliata
fl. Franç.
aquatica *Bosc*
caespitosa
Desf. *
calycina
capillata *
ciliata *Pers.*
decumbens *
diandra
geniculata
pratensis *
pumila
Schrad. *
rubra *
spadicea *
tenella *
tenuifolia
varia
Schrad. *
Ficus stipulata
Fragaria
collina *
Fraxinus
excelsior
— var. parvifolia
juglandifolia
lentiscifolia

G

Galega
ochroleuca
orientalis
Galium
adhaerens
H. Vind.
anglicum *
angulosum
H. Paris
villosum
Gardenia
florida
fl. pleno
Gaultheria
procumbens
Genista
decumbens *
Geranium
bohemicum
nemorosum
Nob. *
Geum
intermedium
macrophyllum
reptans
Gleditschia
triacanthos
laevis
Globularia
longifolia
Gloxinia maculata
Glycine
frutescens
precatoria
sarmentosa
Gnidia simplex

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

G

Gomphraena
brasiliensis
Goodenia ovata
Gorteria pectinata
Gypsophyla
perfoliata

H

Hakea pectinata †
pugioniformis
Halleria lucida
Harrachia
speciosa
Jacq.
Hasselquistia
cordata
Hedypnois
arenaria
maritima
H. Vind.
Hedysarum
junceum
Helianthemum
canum
umbellatum
Helianthus
atrorubens
flexuosus
H. Vind.
Heracleum
angustifolium
Hermannia scabra
Heuchera
americana
Hibiscus
Bamia *Targ.*

H

Hibiscus
hispidulus
H. Bon.
Moscheutos
phyladelphi-
cus *H. Paris*
speciosus
Trionum *
ternatus
Hieracium
amplexicaule
fallax
glaucum
humile *
integrifolium
Lawsonii
paludosum *
pseudo-pilo-
sella
Nob. *
ramosum
Sabinum
Sebast. *
Holcus
bulbosus
Hydrangea
arborescens
Hydrocotyle
spananthe
Hydrophyllum
magellanicum
Hyoseris
hedypnoides
Lin. Fil.
muricata
Hypericum
Kalmianum

H

Hypochoeris
arachnoides
Desf.
hirta
hispida
Hypoxis alba

I

Jasminum
gracile
humile
Sambac
fl. pleno
Jatropha Curcas
Iberis carnosa *
Ilex myrtifolia
Illecebrum sessile
Indigofera
caroliniana
madagasca-
riensis
H. Paris
Inula bifrons
suaveolens
Ipomaea luteola
Iresine
celosioides
Iris lutescens
variegata
Juncus
acuminatus
compactus
Hop. *
Forsteri
Smith. *
glaucus *

I

Justicia
paniculata
Ixia bulbifera
hyalina
lancea
squalida
villosa
Ixora
crocata

K

Kaempferia
Galanga
Kalmia
angustifolia
glauca
latifolia
Koeleria
albescens
DC. *
hispida
Id. *
tuberosa *
Kyllinga
incompleta
umbellata

L

Lactuca crispa
intybacea
palmata
perennis *
stricta
Lantana nivea
salvifolia

L

Lapsana crispa
lyrata
Laserpitium
gallicum
pilosum
silaifolium *
Lathyrus
latifolius
Laurus benzoin
Leontodon
serotinus
Lepidium
latifolium
spinosum
Leptospermum
ambiguum
arachnoideum
lanigerum
squarrosum
Desf.
tomento-
sum †
Ligusticum
scoticum
sibiricum
Linaria acutangula
Nob. *
hirta
glauca
origanifolia
supina
tristis
Linum
aegyptiacum †
austriacum
Lippia rubra
H. Mediol.

L

Lobelia fulgens
laurentia
splendens
Lolium asperum
H. Berol.
Lonicera Diervilla
nigra
Lotus argenteus
— *var. angu-*
stifolius
gebelia
sericeus *DC.*
Lunaria canescens*
Lychnis alpina *
Lysimachia
decurrens

M

Malpighia glabra
Malva balsamica
bryonifolia
coccinea
H. Paris.
coromande-
liana
limensis
macrotica
H. Paris.
microcarpa
veneta
H. Monsp.
Marrubium
acetabulo-
sum *
Matricaria
capensis

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

M

Maurandia
antirrhiniflora
Medicago
aculeata *
agrestis
Nob. *
doliata
Carmig.
lappacea
Lmk.
polycarpa
H. Berol.
Melaleuca
ericaefolia
Melampodium
longifolium
Melilotus
alba
H. Paris.
altissima
incisa †
Kochiana
Petitpierreana
reflexa †
Melissa
cretica
pyrenaica
Melochia
pyramidata
Mesembryanthemum
albidum
australe
bellidiflorum
forficatum
pinnatifidum
spinosum

M

Mesembryanthemum
verruculatum
Mespilus
japonica
latifolia
Poir.
Metrosideros
angustifolia
lanceolata
angustifolia
latifolia
myrtifolia †
saligna
Micropus
supinus
Milium
multiflorum *
Mimulus
guttatus
DC.
Momordica
charantia
cylindrica
Monarda
punctata
Musa coccinea
Myagrum
hyspanicum
sativum
Myosotis
squarrosa
Myrica cordifolia

N

Napaea laevis

N

Narcissus
incomparabilis
Nepeta hirta †
Mussini
H. Viln.
Nicotiana
angustifolia
Nerium odorum
— *var. pumilum*

O

Ocymum
anisatum
H. Viln.
hirtum
Encycl.
thyrsiflorum
Oenanthe
parviflora
H. Paris.
Oenothera
fruticosa
grandiflora
sinuata
Ononis hircina
hispanica
inclusa *Poir.*
mollis
Savi *
pinguis
olygophylla
Nob. *
Onopordon
tauricum

O

Ophrys
ovata *
Orchis
latifolia *
simia *
Origanum
aegyptiacum
humile
Desf.
onites
Ornithogalum
coarctatum
Orobus
angustifolius
niger
varius
venetus
H. Bon.
Oxalis asinina
flava

P

Pancratium
declinatum
illyricum
Panicum capillare
crus-corvi
divaricatum
echinatum
geniculatum
germanicum
repens *
sibiricum
virgatum
Papaver
cambricum

P

Paspalum
tenellum
Passiflora alata
foetida
minima
pedata
Pelargonium
adulterinum
angulosum
canum
cordatum
elegans
formosissimum
myrrhifolium
ribifolium
speciosum
D. Cours.
therebinthinaceum
Peltaria
alliacea *
Peucedanum
tauricum
H. Paris.
Phaca
reptans
H. Paris.
Phalangium
milleflorum
ramosum
Phalaris
minor
Phaseolus
incanus †
saponaceus
H. Paris.

P

Phaseolus
sophia
H. Paris.
Phleum
Bellardi
echinatum
Host
Hostii
Michelii
Phlomis
aspera
indica
laciniata
Phlox divaricata
paniculata
— *var. fl. albo*
Phormium tenax
Phylica
buxifolia
ericoides
Physalis
barbadensis
foetens
Bombl.
tuberosa
Picris pauciflora
Pimpinella dioica
Pinus Abies
coerulea
australis †
balsamea
brutius
Nob. *
canadensis
Laricio *
Larix
mitis *Noisette*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

P

Pinus nigra
rubra
Piper
Clusiaefolium
H. Bon.
non. Will.
obtusifolium
pereskiaefolium
Pittosporum
undulatum
Plantago asiatica
Murray
depressa
Will.
hirsuta
H. Monsp.
montana *
saxatilis
H. Berol.
serpentina
squarrosa
vaginata
victorialis
villosa *Pers.*
Plectranthus
punctatus
Poa amabilis *Zea*
badensis
caesia *Smith*
distichophylla
Host.
festucaeformis
laxa
laeta *Will.*
sudetica
tenella

P

Podalyria
australis
Podophyllum
peltatum
Polygala
flavescens
DC. *
Polemonium
coeruleum
— var.fl.albo
gracile
H. Berol.
Polygonum
Bellardi *
Pontederia
cordata
Potentilla
inclinata
laciniata
Kit.
ruthenica
sericea
supina
Poterium
polyganum
Praenanthes
japonica
Prunus Cocomilia
Nob. *
dasycarpa
Mahaleb
fr. flavo
Psidium
montanum
Psoralea
corylifolia
hyrta

P

Psoralea
lathyrifolia
Balb.
tenuifolia
Pulmonaria
angustifolia *
Pyrethrum
bipinnatum
pinnatifidum
pulverulentum *Will.*
enum. non
Pers.
Pyrus amelanchier

Q

Quercus
conglomerata*
fastigiata
Frainetto*Nob.*
haliphleos *
pubescens *
robur
— var. lanuginosa

R

Ranunculus
abortivus
brevifolius
Nob. *
flabellatus *
nodiflorus *
tuberculatus
Kit.

R

Rhagadiolus
Koelpinia
lapsanoides
H. Paris.
Rhamnus
Frangula
Rheum
hybridum
Rhinanthus
hirsuta
Lmk. *
Rhododendron
maximum
album
roseum
rubrum
ponticum
Ricinus
africanus
Rivina
purpurascens
Robinia
agapantha †
althagana
Rosa alpina
glauca
H. Paris.
montana *
pendulina
portlandica †
villosa
Rubia
cordifolia
Rubus
hirtus *
odoratus

R

Rudbeckia
digitata
Ruellia
clandestina
paniculata
pubescens
H. Vind.
strepens
Rumex confertus
crispus
divaricatus
nemorosus
undulatus
H. Paris.
Ruta
angustifolia

S

Salix riparia
triandra
Salsola rosacea
sedoides
Salvia
amplexicaulis
austriaca
bullata *Vahl*
campestris
Forskalei
hirsuta
illyrica *Brot.*
lanigera
H. Paris.
nutans
oblongata
Vahl
— var.fl.rubro

S

Salvia odorata
patula
pulchella *DC.*
scabiosaefolia
Spielmanni
sylvestris
truncata
variegata
Sambucus nigra
— var.fr.albo
Sanseverinia
carnea
Santolina
crithmifolia
Wil.
Saponaria
orientalis
Satureja
filiformis *
Saxifraga
aizoides
longifolia
Sternb.
Scabiosa agrestis
alpina
caucasica
centauroides
dichotoma
graminifolia *
hybrida *Vit.*
laevigata *Kit.*
laxiflora *Will.*
palaestina
rutaefolia *
sicula
Scabiosa tatarica
ucranica
*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

S S S

Scirpus
baeothryon
— *var. campestris* *
machrostachys *
Scorzonera
angustifolia
coronopifolia *
octangularis
parviflora
purpurea
stricta *Horn.*
Scrophularia
biserrata
grandidentata *Nob.* *
mellifera
sambucifolia
Scutellaria
albida
integrifolia
lateriflora
minor
Sedum
atratum *
repens *
villosum
— *var. hirsutum* *
Selinum
Carvifolia
elegans *Balb.*
Senecio
delphinifolius *
Senecio
reclinatus
rupestris *
Seriola
taraxacoides *Lois.* *
Serratula
lyrata *Spr.*
pinnatifida *H. Paris.*
pulchella *Fisch.*
Sesamum
indicum
Seseli gracile
hippomarathrum *
Pallasia *H. Cantabr.*
Sesleria cylindrica *Balb.* *
nitida *Nob.* *
Sida acerifolia *H. Monsp.*
altheifolia
canescens
disticha
frutescens
indica
paniculata
populifolia
rotundifolia
tomentosa
triangularis
ulmifolia
Sideritis
candicans
Sideroxylum
spinosum
Silene bicolor *H. Paris.*
cretica
disticha
eranthema *H. Lugd.*
glauca †
glutinosa
italica *
livida
longicaulis *Poir.*
longiflora
micropetala *DC.*
ocymoides *H. Paris.*
parviflora
spicata
stricta
undulata
Silphium
laciniatum
therebinthinaceum
Sinapis Allioni
brassicata
Sison Ammi
flexuosum *Nob.* *
Thomasii *Nob.*
Sisymbrium
affine *Bern.*
altissimum
bursifolium

S S S

Sisymbrium
glabrum
junceum *H. Paris.*
orientale
pyrenaicum
Sisyrinchium
anceps
Smilax china
salsaparilla
Solanum
betaceum
ciliare
Fontanesianum *H. Monsp.*
heterodoxum *Dun.*
heterophyllum
Humboldtii
laurifolium *L. Fil.*
miniatum
pseudo-lycopersicum
quercifolium
sanctum
Solidago
arguta
mexicana
Sonchus
lapponicus
pensylvanicus *Spr.*
Sophora
microphylla
Sophora
tetraptera
Sorbus hybrida
Sparmannia
africana
Spartium
sphaerocarpum
Spermacoce
tenuior
Spilanthus
Acmella
fusca
Spiraea
Aruncus
crenata
Stachys
glutinosa
scordifolia *Will.*
Stapelia
asterias
bisulca *Jacq.*
bufonia
deflexa *Jacq.*
geminata
glauca
grandiflora
marmorata *Jacq.*
normalis *Jacq.*
planiflora
radiata
Statice
alpina *
auriculaefolia
Statice
latifolia
mucronata
plantaginea
scorzoneraefolia
spathulata
Staevia
ivaefolia
linearis
ovata
Stipa
tortilis *
Symphytum
bullatum *Horn.*
tauricum

T

Tanacetum
annuum
Teucrium
regium
Thapsia villosa
Thalictrum
concinnum
Cornuti
discolor *H. Monsp.*
nigricans
rugosum
sibiricum
Thea
Bohea
Thrincia
hispida

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

T

Thymbra
ciliata *
Thymus
marifolius
Tiarella
cordifolia
Tilia
alba
Tournefortia
foetidissima
hirsutissima
volubilis
Tradescantia
cristata
Tragopogon
orientale
Trifolium
alpestre *
aureum
Thuill. *
badium
Bocconi
Savi *
bracteatum
caespitosum
elegans *Savi*
expansum
Kit.
hybridum *
lagopus *
Sebastiani
Savi
supinum
Savi *
Trigonella
aegyptiaca
esculenta

T

Tripsacum
hermaphroditum
Triticum
densiflorum
glaucum
Host.
littoreum
Host.
lolioides *
pectinatum
prostratum
rigidum
sibiricum
Triumfetta
semitriloba
Typha minima *

U

Ulmus
campestris
tortilis
Uniola
latifolia
Urtica
Dodartii

V

Valantia
pedemontana*
Valeriana
angustifolia
Valerianella
eriocarpa
Desv.

V

Valerianella
imbricata
Fedia imbricata Pers.
pubescens
Merat.
Vella
annua
Veltheimia
viridifolia
Verbascum
glabrum
montanum
Schrad.
phoeniceum
pulverulentum *
Rolletianum
H. Vind.
virgatum
Verbena
angustifolia
paniculata
Verbesina
nodiflora
Vernonia
glauca
novaeboracensis
Veronica
argentea
arguta
bellidioides
crenulata
dentata
foliosa
media

V

Veronica
neglecta
Ponae
ruthenica
H. Vind.
saxatilis
spuria
villosa
Vicia
articulata
boetica
Schous.
Michauxii

V

Vicia
pannonica *
saepium *
Viola
heterophylla
Bert. *
montana *
palustris *

W

Westringia
rosmarinacea

X

Xanthium
orientale
Xeranthemum
bracteatum

Z

Ziziphora
serpillacea
taurica
tenuior
Zizyphus sinensis

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

APPENDIX
PLANTARUM
FLORAE NEAPOLITANAE
QUAE NONDUM
IN HORTO REGIO COLUNTUR.

A

Acer obtusatum
Achillea alpina
Adonis apennina ?
Agrostis arundinacea
canina
plumosa *Nob.*
Aira alpina
coerulea
Ajuga pyramidalis
Allium moschatum
trifoliatum *Cyr.*
victoriale
Alopecurus geniculatus

A

Alyssum alpestre
cuneifolium *Nob.*
orientale
Ambrosinia Bassii
Anabasis tamariscifolia
Anagallis Monelli
Androsace carnea
Anemone alpina
Anthyllis hirsuta
Arenaria grandiflora
uliginosa *DC.*
Aronia rotundifolia
Artemisia abrotanum
maritima

A

Aspidium spinulosum
Astragalus alpinus
Athamantha Matthioli
Atriplex laciniata
— *var. sinuata*
veneta
Avena pubescens

B

Brassica hispida
Bromus multiflorus
leptostachyos
ramosus
Bryonia alba

B

Buccaferrea cirrhosa *Pet.*
Bunium bulbocastanum
— *var. minus*
Bupleurum junceum
rotundifolium
— *var. longifolium*

C

Cachrys laevigata
Callitriche dioica *Pet.*
Campanula glabra
Cardamine pratensis
Carduus cyanoides
Carex acuta
collina
depauperata
nigra
schoenoides
Centaurea napifolia
Centunculus minimus
Cerastium grandiflorum
longifolium *Nob.*

C

Cerastium ovale *Pers.*
Ceterach Marantae
Chaerophyllum bulbosum
Chara flexilis hispida
Chenopodium maritimum
Chlora imperfoliata
Chrysanthemum italicum
Chrysosplenium oppositifolium
Cnicus pauciflorus
Coris monspeliensis
Coronilla juncea
Cucubalus pumilio
Cynanchum monspeliacum
Cyperus pulcher

D

Delphinium peregrinum
— *var. fol. tomentosis*
Dianthus alpinus

D

Digitalis parviflora *Lmk.*
Doronicum althaicum

E

Epilobium montanum
— *var. alpestre*
Equisetum pratense
ramosum
variegatum
Erica mediterranea
scoparia
umbellata
Erinus alpinus
Euphorbia denticulata *Pers.*
epithymoides
exigua
— *var. diffusa*
Isatis *Pers.*
Euphorbia provincialis
Euphrasia pectinata *Nob.*

F

Festuca coerulescens

Orto Botanico di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II

F

Festuca
maritima
Fl. Fr.
valesiaca
Gaud.
Fraxinus
angustifolia

G

Galium rubrum
Genista
lusitanica
Gentiana
grandiflora
— *var. alpina*
Pneumonanthe
utriculosa
verna
Geranium
lividum
Geum
montanum
rivale
Glaux maritima

H

Hedypnois
rhagadioloides
Helianthemum
tuberaria
Heracleum
lanatum
Hieracium
angustifolium
auricula
chondrylloides
saxatile
Holosteum
umbellatum
Hypericum
fimbriatum

I

Iberis sempervirens
Illecebrum
serpyllifolium
Impatiens
nolitangere
Isnardia
palustris
Juncus
adscendens

K

Kernera
oceanica

L

Laserpitium
ferulaceum
Leontice
leontopetalum
Leucojum
autumnale
Lolium asperum
Loranthus
europaeus

M

Marsilea natans
pubescens
Nob.
Montia
fontana

O

Orchis
moravica
Ornithopus
perpusillus
Orobanche
foetida
tinctoria
Orobus
tuberosus

P

Papaver dubium
Parietaria
lusitanica
Phleum
Gerardi
Phlomis
lychnitis
Phucagrostis
major
Picris
aculeata

P

Pinguicula
alpina
villosa
Plantago
recurvata
Will.
Polygonum
aviculare
— *var. angustifol. calycibus purparescen.*
Potamogeton
hybridum
Pet.
Potentilla alba
appennina
Nob.
Praenanthes
viminea
Primula
marginata
Prunus
insitiicia

R

Ranunculus
aconitifolius
alpestris
napellifolius
Crantz
Ranunculus
rutaefolius
Rhotia
andryaloides
runcinata
Rosa saepium
Thuil.
Rubia
peregrina
Ruppia
maritima

S

Salix Croweana
Salvia
pyramidalis
Pet.
Saxifraga
autumnalis
Burseriana
mixta *Pers.*
pyramidalis
Scabiosa
pterocephala
succisa
— *var. hirsuta*
Scilla italica
Scirpus
mariscus
— *var.*
Michelianus
Senecio
saracenicus
Spartium
radiatum
Stellaria
alpina
graminea

T

Thesium
ramosum
Thymus
patavinus
Trifolium
alpinum
Tulipa
Celsiana
Redoutè

V

Viola
mirabilis
Viscum
album

Z

Zostera
marina.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

SYNOPSIS
NOVARUM PLANTARUM,
QUAE IN PRODROMO
FLORAE NEAPOLITANAE,
ANNO 1811-13 EDITO, DESCRIBUNTUR.

1. Veronica Buxbaumii. Florlbus solitariis pedunculatis, foliis profunde crenatis hirsutis, corollis calyce longioribus, pedunculis fructificantibus, cernuis, capsulis obreniformibus, dilatatis compressis acutis ciliatis, calyce longioribus. Annua. *Flor. Neap. Prodr. pag. VI. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 7. *tav. I. Buxb. cent.* 1. *tab.* 40. *f.* 2.

Habitat ad agrorum margines.

In Buxbaumii *cent.* 1. *pag.* 25. *tab. XL.* duae extant icones, quarum prima ad *Veronicam filiformen* pertinet, altera ad nostram speciem; simplicique intuitu facile harum specierum differentiam agnoscitur. In *Veronicae filiformis* descriptione, ex Encyclopedia *tom.* 8. *pag.* 538., et ex Vahl *enum. pl. vol.* 1. *p.* 82. *num.* 63., folia dicuntur minuta subrotundo-cordata, laeviter crenata, pilis raris adspersa, lente tantum conspiciendis; pedunculi longissimi, calycis laciniae lanceolatae, capsulaeque obcordatae. At in nostra specie folia sunt quadrilinearia et ultra, ovalia profunde dentata, dentibus crenatis, hirsuta; pedunculi vix duplo foliis longiores, calycis laciniae ovatae, corollae lobi rotundati obtusi et capsulae reniformes dilatatae. Ipse Buxbau-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

mius loco citato in veronicae nostrae descriptione monet sequentia « *haec species floribus eleganter coeruleis striatis , caulibus erectioribus , a minore* (filiformi) *differt.* »

2. Ixia purpurascens. Scapis unifloris ; foliis linearibus canaliculatis , angulatis , rigidis , erectis , longissimis; corollis purpureis , petalis tribus externis , externe viridibus , fusco-lineatis. Perennis. *Flor. Nap. vol.* 1. *pag.* 13. *tav.* 2.

Habitat in montibus Siciliae ; in hortis colitur.

3. Cyperus aureus. Culmo triquetro nudo , foliis lanceolatis , canaliculatis , revolutis , laete-virentibus , umbella decomposita erecta , spicis linearibus fasciculatis , aureo-lutescentibus , radice tuberosa , repente. Perennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. VIII.*

Habitat in arvis prope Neapolim.

4. Phalaris Barrelieri. Panicula cylindrica spiciformi ; glumis calycinis divaricatis planis , ovato-ciliatis , argenteis , corollarum valvis interioribus bidentatis ; foliis pilosis. Annua. *Fl. Neap. Prodr. pag. VIII.*

Habitat ad litora Insulae Inarimes.

5. Festuca Barrelieri. Spica simplici disticha , spiculis subsessilibus 20-floris remotis muticis. Annua. *Fl. Neap. Prodr. pag. IX.*

Habitat in antiqua Lucania hodie Basilicata.

A *Bromo ramoso* differt panicula compacta simplici , nec effusa ac ramosa , foliis glabris non asperis hispidisque , denique toto habitu. A *Festuca caespitosa* differt , foliis lanceolatis planis , non capillaribus et convolutis , culmo erecto , superne folioso non nutante aphyllo.

6. Bromus Scaberrimus. Panicula aperta, pedunculis erectis verticillatis , elongatis simplicibus , ramosisque ; locustis 12-floris hispidis scaberrimis fuscis , aristis glumarum longitudine ; foliis villosis. Annuus. *Fl. Neap. Prodr. pag. X.*

Habitat in pascuis siccis Montis Virginis in Principatu Ulteriori.

7. Bromus jubatus. Panicula aperta laxa , pedunculis

longissimis verticillatis , capillaribus , horizontalibus pendulisque , locutis 5-7 floris ; glumis glabris , aristis glumis duplo longioribus ; foliis glabris. Annuus. *Ibidem.*

Habitat cum praecedente.

A *B. maximo* Desf. differt panicula laxa , pedunculisque capillaribus longissimis effusis.

8. Sesleria nitida. Spica ovata , spiculis quadrifloris nitidis mucronatis , corollis coeruleis ; floribus vaginantibus obtusis glabris , caulinis brevioribus. Perennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. X.*

Habitat in pascuis siccis Montis Cerealti , in Principatu Ulteriori.

9. Agrostis plumosa. Panicula contracta subspicata flexuosa , calycibus muticis obtusiusculis , undique plumoso-sericeis ; foliis involutis rigidis , culmo ramoso , basi infracto. Annua. *Fl. Neap. Prodr. sup. I. pag. LIX.*

Habitat in Calabria Ulteriori prope Rhegium.

10. Rotboella spathacea. Spicis axillaribus fasciculatis pedunculatis , basi vaginis spathaceis cinctis ; spica recta compressa subulata , flosculis bifariis adpressis; glumis calycinis binis acutis ; foliis conduplicatis glabris , caule humifuso. Perennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. XI.*

Habitat in pascuis humidis prope Neapolim , in locis , vulgo dictis : *Pascone* , *Bagnoli* , etc.

R. fasciculata Desf. habet caulem constanter erectum.

11. Hakea lanigera. Caule arboreo , ramis verticillatis adscendentibus , junioribus lanatis , foliis confertis sparsis teretibus , rigidis mucronatis glaucis , pilis deciduis indutis , petalis subglabris , capsulis pyriformibus rostro bicorne. *Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 22. *tav.* 6.

Habitat ad Novam Hollandiam ; colitur in Horto Regio.

Hakea pubescens habet ramos cernuos. *H. sericea* habet folia glabra.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

12. Globularia bellidifolia. Caule fruticoso repente, foliis spathulato-cuneiformibus, crenatis; scapo nudo; capitulo terminali. Peren. *Fl. Neap. Prodr. pag. XI.*

Habitat in Monte Magella Aprutii Citerioris.

Species intermedia inter *S. nudicaulem*, et *vulgarem*; a *nudicaule* differt foliis cuneiformibus dentatis; a *vulgari* caule procumbente aphyllo; Ad *G. cordifoliam* tamen accedere videtur, at in nostra planta folia sunt in ambitu crenata, nec tantum tridentata.

13. Scabiosa ceratophylla. Caule fistuloso villoso; foliis radicalibus lyratis, crenatis, caulinis bipinnatifidis, laciniis linearibus falcatis; calycibus discum aequantibus; seminibus 5-radiatis. Biennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. XII. Fl. Nap. vol. 1. pag. 31. tav. 8.*

Habitat in nemoribus Aprutii.

14. Scabiosa Columnae. Caule fistuloso hirsuto; foliis radicalibus obovatis, lyratisque, crenatis; caulinis pinnatifidis, laciniis cuneiformibus incisis, hirsutis; capitulo globoso; corollis quinquefidis radiantibus, seminibus 3-5-radiatis. Biennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. XII. Fl. Nap. vol. 1. pag. 29. tav. 7.*

Habitat undique secus vias.

15. Asperula tomentosa. Caule basi suffruticoso, procumbente, foliis quaternis, subcarnosis, inferioribus ellipticis, superioribus linearibus obtusis revolutis; floribus subquaternis aristatis. Planta tomentosa. Perennis. *Fl. Neap. Prodr. pag. XII. Fl. Nap. vol. 1. pag. 34. tav. 9.*

Habitat in rupibus calcareis Insulae Caprearum.

16. Plantago eriostachya. Foliis lanceolatis quinquenerviis denticulatis pilosis, basi dense-lanatis, scapis angulatis, spicis ovatis lanatis. Annua. *Fl. Neap. Prodr. pag. XIII.*

Habitat in arvis undique.

17. Plantago brutia. Foliis ovatis septemnerviis, remote profundeque dentatis, scapo angulato, spica ovato-oblonga compacta glabra, bracteis calycibus-

que virescentibus. Perenn. *Fl. Nap. Prodr. sup. 1. pag. LIX.*

Habitat in monte Pollino Calabriae Citerioris.

18. Anchusa hybrida. Foliis oblongo-lanceolatis sinuato-dentatis, undulatis, racemis confertis bipartitis, calycibus quinquefidis obtusis, fructiferis inflatis cernuis, corolla clausa squamis brevibus obtusis. Planta villoso-hispida. *Buglossum syl. min.* Bauh. pin. 256. Annua. *Fl. Nap. Prodr. pag. XIV. Fl. Nap. vol. 1. pag. 45. tav. 11.*

Habitat prope Neapolim secus vias.

Ab *A. Officinali* differt foliis oblongo-lanceolatis undulatis, ab *A. undulata*, foliis minime strigosis, latioribus obtusis, basi amplexicaulibus; ab *A. angustifolia*, calycibus inflatis laciniis obtusiusculis.

19. Echium prostratum. Caule herbaceo procumbente ramosissimo strigoso, foliis radicalibus, caulinisque ellipticis petiolatis tuberculoso-hispidis, corollis calycibus duplo longioribus, staminibus corolla duplo brevioribus, calycibus fructificantibus inflatis. Annuum. *Fl. Nap. Prodr. pag. XIV. Fl. Nap. vol. 1. pag. 50. tav. 12.*

Habitat in Insula Caprearum.

Cl. Vivianius (*Fl. Ital. fragm. fasc. 1. p. 2. tav. 4.*) novam *Echii* speciem describit, sub nomine *E. calycini*; in sua icone ramulum tantum hujus plantae repraesentatur quae ad nostram plurimum accedere videtur, sed Echii calycini descriptio et synonima meae plantae minime accomodantur. In illo nempe caulis adscendens basi ramosus, foliaque oblonga acuta indicantur; dum noster caules plures prodest humifusi, apice tantum ramosi, foliaque elliptica et obtusa. Tilli synonimon: *E. annuum folio lithospermi arvensis, flore coeruleo parvo* Hort. pis. p. 56. tav. 23. f. 3. a Cl. Vivianio sub suo *echio* refertum, *echio parvifloro Rot.* potius pertinere videtur. In ipso revera corollae calycibus subaequantibus, caulisque erectus observantur. Synonimon *Buglossum scorpioides hirsutum flore coeruleo.* Bocc. *Mus.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

p. 163. tab. 130. et *Barrel. observat.* 141. tab. 403. ob folia sinuata et corollarum formam, nullomodo ad *Echium calycinum* referri potest, sed potius ad meam *Anchusam hybridam* amandandum.

20. Lithospermum rosmarinifolium. Fruticosum; foliis lincaribus margine revolutis, supra glabriusculis, pilis raris adpressis lente conspicuis, subtus incanis; corollis calycibus triplo majoribus, staminibus tubo corollae subaequantibus. *Flor. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXV.*

Habitat in Insula Caprearum inter fissuras rupium.

A *fruticoso* differt caule elatiore 3 pedali, et ultra, foliis latioribus subglabris, nec pilis erectis utrinque hispidis.

21. Gynoglossum magellense. Foliis lineari-lanceolatis, inferioribus sessilibus, superioribus basi amplexicaulibus latioribus, utrinque villoso-lanatis; racemis cernuis compactis; calycibus 5-partitis, laciniis linearibus dense lanatis, corollis calycibus subaequantibus, limbo 5-fido, lobis rotundatis, seminibus membranaceis, centro et margine muricatis. Peren. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI.*

Habitat in Magella.

A *Cynoglosso lanato*, cui affine, differt stylo corolla breviore, laciniis rotundatis, foliis caulinis radicalibus aequantibus, aliisque notis.

22. Primula Columnae. Foliis obovatis dentatis villosis, rugosis, petiolis alatis, corollis longitudine calycis, tubi collo cylindrico, scapo centrali multifloro. *Paralytica rotundifolia montana.* Column. ecphr. par. 1. p. 156. cum ic. *Fl. Nap. Prodr. p. XIV. Fl. Nap. vol. 1. p. 54. tav. 13.*

Habitat in pascuis montium Aprutii.

A *P. officinali* differt corolla limbo latiori planiusculo, lobis emarginatis, margine integerrimis, nec corolla limbo brevi concavo, laciniis margine crenatis, foliis petiolatis ovato-cordatis subtus tomentosis.

A *P. elatiori* differt tubo corollae cylindrico, non haemisphaerico, calycibus corollis subaequantibus, nec corollis triplo brevioribus.

23. Convolvulus hirsutus. Caule volubili hirsuto; foliis radicalibus cordatis rugosis repandis, dentatis, caulinis palmato-incisis, hirsutis, pedunculis biforis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. p. XV. Fl. Nap. vol. 1. p. 60. tav. 15.*

Habitat in saepibus Bajarum prope Puteolos, et in Insula Caprearum.

A *C. altheoide* differt toto habitu, caule volubili per saepes mirum procurrenti, hirsutie holosericea, colore atrovirenti totius plantae, minime albo-tomentosa. Cultura non immutatur.

24. Campanula trichocalycina. Caule simplici basi hirsuto, foliis subsessilibus ellipticis, grosse remoteque serratis; dentibus apice setaceis, racemo terminali subsimplici, floribus breviter pedunculatis, calycinis laciniis capillaribus longissimis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI. Fl. Nap. vol. 1. p. 67. tav. 16.*

Habitat in sylvis montis Cerealti, et Pollini Calabr. Citer.

25. Campanula obliquifolia. Hirsuta, caule simplici erecto; foliis radicalibus oblongis, basi oblique-cordatis, repandis, bicrenatis, petiolis alato-membranaceis, caulinis amplexicaulibus, petiolis late alatis; racemis paniculatis secundis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XV. Fl. Nap. vol. 1. pag. 69. tav. 17.*

Habitat in nemoribus montis Magellae.

An Camp. bononiensis *var.*? sed in nostra planta folia radicalia sunt longe petiolata, obliqua, et calyx omnino glaber est.

26. Campanula foliosa. Hirsuta, caule angulato simplici, foliis omnibus petiolatis ovatis bidentatis, petiolis alatis, floribus sessilibus capitato-glomeratis, involucri foliis ovato-cordatis latissimis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI. Fl. Nap. vol. 1. p. 71.*

Orto Botanico di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II

tav. 18. *Trachelium alpinum, floribus conglomeratis, foliis Asarine rigidis et hirsutis.* Herm. par. 235. tab. 235.

Habitat in sylvis Montis Virginis et Magellae.

A *Camp. glomerata* differt foliis ovato-cordatis, petiolis alatis, foliis floralibus ovato-cordatis latissimis, floribus intrafoliaceis, interrupte-spicatis.

27. Prismatocarpus hirtus. Caule erecto, ramis patentibus subtrifloris, foliis oblongis subcrenatis obtusis, corollis calycibus aequantibus. Annuus. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 76. *tav.* 19.

Habitat in agris undique.

A *P. speculo* differt hirsutie totius plantae, caule erecto, calycibus corolla brevioribus.

28. Prismatocarpus falcatus. Laevis; caule erecto simplicissimo, foliis obovatis pubescentibus subcrenatis, floribus axillaribus sessilibus, corollis calycibus duplo-brevioribus, laciniis falcatis acuminatis. Annuus. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 77. *tav.* 20.

Habitat in collibus umbrosis *Agnani* prope Neapolim.

29. Verbascum niveum. Foliis radicalibus petiolatis, obovato-cuneatis, caulinis amplexicaulibus ellipticis, crenatis, utrinque tomentosis; spica simplici compacta, filamentis barbatis, pilis albis. Planta niveo-tomentosa. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 90. *tav.* 22.

Habitat in pascuis montium Lucaniae.

A *V. Lychniti*, cui affine, differt spica simplici floribus sessilibus, a *V. phlomoidi*, spica simplici compacta nec ramosa interrupte-racemosa.

30. Verbascum longifolium. Foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, radicalibus longissimis subpetiolatis, caulinis amplexicaulibus, subtus tomento densissimo albicante, supra tomento floccoso secedente luteo-aureo, indutis; spica subramosa dense lanata. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 89. *tav.* 21.

Habitat in pascuis montium Aprutii.

Verbascum montanum tomentosum longifolium, roluteum, foliis non serratis, flore parvo, caule rotundo. *D. Michelii.* Till. Hort. Pisan. pag. 171.

31. Verbascum rotundifolium. Foliis radicalibus longe petiolatis subrotundis, caulinis inferioribus ovalibus petiolatis summis amplexicaulibus, omnibus crenatis undulatis, tomento cinereo utrinque indutis, spica interrupta subracemosa, basi subramosa. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 92. *tav.* 23. *Verbascum tomentosum et incanum, folio subrotundo, et quasi circinato, caule non alato, flore luteo, staminulis purpureis, fructu longiore. D. Michelii.* Till. Hort. Pis. p. 171.

Habitat in collibus Amalphitanis, et in Insula Caprearum.

32. Verbascum angustifolium. Foliis inferioribus petiolatis lanceolatis crenulatis, superioribus amplexicaulibus ovato-oblongis; spica simplici compacta, filamentis pilis albis barbatis. Planta pedalis; tomento floccoso albicante induta. Bienne. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI.*

Habitat in pratis siccis Nicoterae Calabriae Citerioris.

33. Cyclamen neapolitanum. Foliis ovato-cordatis angulatis crenatis, petalis ovatis obtusis; radice maxima rapacea. Floret autumno. Perenne. *Fl. Nap. ibidem.*

Cyclaminus inodoro purpurascente flor. Clus. hist. 1. *pag.* 265. *ic.*?

Habitat in sylvis, undique commune.

34. Hyoscyamus auriculatus. Caule erecto simplici, foliis ovatis petiolatis sinuatis acutis, petiolis alatis, basi auriculatis; floribus subsessilibus corollis luteis, fundo venis purpureis reticulatis. Annuus. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI.*

Habitat in arvis Abellinarum.

35. Rhamnus pusillus. Inermis, repens, floribus dioicis, foliis obovato-cuneatis ultra medium crenula-

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

tis apice mucronatis. Frutex. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVI.*

Habitat in rupibus calcareis montis Magellae.

36 Bupleurum trifidum. Caule erecto 4-pedali ramoso, foliis lanceolatis 9-nerviis, summis falcatis; involucris triphyllis brevissimis lineari-subulatis, involucellis pentaphyllis setaceis, umbellis trifidis, brevioribus. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVIII.*

Habitat in saepibus siccis Principatus Ulterioris.

37. Bupleurum cernuum. Caule erecto simplici, foliis linearibus obtusis, basi angustioribus, subpetiolatis; involucris subtriphyllis lanceolatis, involucellisque pentaphyllis setaceis, umbellis 5-fidis, radiis capillaribus longissimis, brevioribus. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. pag. XVIII.*

Habitat in rupibus calcareis Montis Virginis, et Matesii.

38. Cachrys sphaerocarpa. Foliis supra decompositis setaceis multifidis subinermibus, fructibus subrotundis sulcatis laevibus. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. pag. XIX.*

Habitat in pascuis siccis Insulae Caprearum.

39. Ligusticum garganicum. Foliis bipinnatis foliis oblique-ovatis, coriaces venosis, glabris, margine cartilagineis, integerrimis, simplicibus, vel profunde tripartitis, involucro universali foliolis plurimis membranaceis, seminibus glabris. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. pag. XIX. Fl. Nap. vol. 1. p. 122. tav. 24. Ligusticum Garganicum amplis foliorum lobis D. Michelii.* Till. Hort. Pis. tav. 39. fig. 1.

Habitat in Monte Gargano Apuliae.

40. Bunium petraeum. Involucro pentaphyllo; foliis biternato-pinnatis carnosis, foliolis cuneiformibus subtripartitis, laciniis linearibus obtusis, caulibus numerosis filiformibus debilibus subnudis ramosis, radice turbinata. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. sup. I. pag. LX.*

Habitat in saxosis Magellae.

41. Sison Thomasii. Foliis omnibus ternatis, foliolis

cuneiformibus inciso-dentatis, dentibus aristatis; floribus paniculato-umbellatis, pedunculis capillaribus fasciculatis effusis; fructibus oblongis incurvis; involucro submonophyllo. Perenne. *Flor. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI.*

Habitat in nemoribus vulgo *della Serra*, Calabriae Ulterioris, prope rivulos.

42. Chaerophyllum hybridum. Caule glabro striato scabriusculo, foliis tripinnatis, foliolis lanceolato-oblongis profunde inciso-serratis, laciniis acuminatis, superficie superiori glabra, inferiori rachide tantum hispida; fructibus biaristatis, aristis divaricatis. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI.*

Habitat in sylvis Magellae.

43. Narcissus unicolor. Spatha multiflora, petalis oblongis, nectario campanulato plicato lacero, petalis sextuplo breviore, scapo foliis planis ligulatis longiore. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXI. Fl. Nap. vol. 1. pag. 144. tav. 26. Narc. latif. simplici flore prorsus albo.* Clus. hist. 1. p. 155. Bar. ic. 937. *Narcissus praecox totus albus major.* C. B. pin. 49. num. 5. Barr. obs. 769. ic. 937. *N. cum pluribus floribus totus albus major.* J. Bau. Hist. 2. pag. 606.

Habitat in Insula Caprearum.

A *N. tazzetta* differt nectario petalis sextuplo breviore, habitusque totius plantae. A *N. niveo Loisl.* corollarum magnitudine, proportione nectarii ac tempore florescentiae; nempe nostra planta floret Novembri, illa Aprili.

44. Narcissus praecox. Spatha multiflora, petalis lanceolatis mucronatis, nectario subcampanulato plicato sexfido, petalis quadruplo breviore, scapo folia plana ligulata, subaequante. *Fl. Nap. Prodr. p. XX. Fl. Nap. vol. 1. pag. 146. tav. 27. Narc. latifolius, flore prorsus flavo.* Clus. hist. 1. pag. 156. *Narcissus luteus constantinopolitanus.* B. pin. 61. num. 3.

Habitat cum praecedente.

A *N. poliantho Loisl.* differt petalis oblongis lon-

Orto Botanico di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II

gioribus , nectario sexpartito petalis quadruplo breviore , nec integerrimo petalis triplo breviore , floribus luteo-virescentibus non albis.

45. Allium tenuiflorum. Caule sub-teretifolio umbellifero , pedunculis capillaribus effusis , corollis cylindricis , petalis linearibus apice revolutis. Perenn. *Fl. Nap. Prodr. p. XXII. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 165. *tav.* 30.

Habitat in pratis siccis Montis Virginis , Cerealti , etc.

46. Allium pendulinum. Scapo nudo triquetro , foliis lanceolato-linearibus carinatis , umbella 3-6-flora , spatha caduca , floribus longe pedunculatis pendulis, corollis globosis , petalis ovatis obtusis , capsulis turbinatis , sexlobatis , petalis persistentibus inclusis , bulbo solido simplici. *Prodr. pag. XXII. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 168. *tav.* 31.

A. *triquetrum* habet bulbum oblongum , folia triquetra , petala ovata acuta incurva , capsula rotundata , hinc a nostro longe diversum.

Habitat in valle vulgo *di S. Rocco.*

47. Allium majale. Caule planifolio umbellifero , duplo foliis longiore , umbella fastigiata compacta , petalis ovalibus , staminibus simplicibus , duplo longioribus ; foliis lato-lanceolatis canaliculatis. *Fl. Nap. Prodr. sup. I. pag. LX. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 160. *tav.* 29.

Habitat in arvis cultis prope Casertam.

Ab *A. carneo* differt umbella haemisphaerica compacta multiflora , petalis ovalibus integerrimis , foliis lato-lanceolatis longissimis.

48. Tulipa praecox. Caule unifloro glabro , flore erecto , petalis ovato-lanceolatis acuminatis , apice barbatis , filamentis basi dilatatis , foliis ovato-lanceolatis , canaliculato-undulatis , margine ciliatis ; bulbo lanato. *Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 170. *tav.* 32.

Habitat Neapoli ad agrorum margines ? In hortis colitur.

Tulipa gesneriana habet petala elliptica obtusa imberbia , folia glauca haud ciliata , bulbumque glabrum. *Tulipa oculus solis* De Cand. Fl. Franc. tom. 3. pag. 200. *T. acutiflora* Encycl. tom. 7. est omnino glabra , ac petalorum basis , macula lineari nigra margine aureo , picta conspicitur ; stamina demum sunt pistillo longiora.

49. Ornithogalum montanum. Floribus corymboso-racemosis , pedunculis brevioribus , petalis linearibus, filamentis basi dilatatis , foliis oblongo-lanceolatis , canaliculatis subrepandis , bulbo solido simplici. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXII. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 175. *tav.* 33.

Habitat in sylvis montis S. Nicolai prope Capuam.

50. Ornithogalum exscapum. Floribus corymbosis , petalis ovato-oblongis , filamentis basi dilatatis , pedunculis fructificantibus refractis , capsulis ovatis maximis sexangulatis , foliis linearibus canaliculatis flaccidis , bulbo solido simplici. *Fl. Nap. Prodr. p. XXII. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 175. *tav.* 34.

Ornithogalum vulgare aliud Clus. hist. 188. *Ornithogalo vulgari simile , latiore folio.* Bauh. Hist. vol. 2. pag. 631.

Habitat in pratis editioribus prope Neapolim : (*a i Camaldoli*) , Casertae , etc.

Ab *O. umbellato* differt foliis latioribus , concoloribus , nec linea longitudinali alba exaratis , petalis ovato oblongis non lanceolatis , capsulis ovatis angulato-repandis non oblongis , bulbo solido simplici , nec prolifero.

Cl. Bauh. l. c. cum haec planta ab *O. vulgari* (*umbellato Lin.*) differri conatur , in ipsa *folia duplo latiora , linea albicante destituta esse* monet.

51. Rumex hirsutus. Floribus hermaphroditis , valvulis integerrimis nudis , foliis cordato-oblongis obtusis , petiolis , costis , venis , caulisque internodiis hirsutis. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXIII.*

Habitat in Lucania.

52. Polygonum elegans. Caule suffruticoso , ramis flexuosis , foliis oblongo-lanceolatis , ochrea cylindrica,

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

internodiis multoties breviore, multifido-ciliata, floribus spicato-paniculatis, corollis regularibus. Perenne. *Fl. Nap. Prodr. sup. II. pag. LXVI. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 207. *tav.* 25.

Habitat in collibus Martinae, Ginosae, etc.

A *P. divaricato* et *Bellardi* abunde differt, caule basi fruticoso, corollisque duplo majoribus; a *frutescenti* corollis regularibus, foliis minime nervosis, ochreisque multifido-ciliatis.

53. Ruta divaricata. Caule suffruticoso, foliis bipinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis remotis pellucido-punctatis, obtusis, obiter serratis; petiolis foliorumque ramificationibus divaricato-scandentibus, petalis ovatis crenatis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXIV. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 222. *tav.* 36.

Habitat in rupibus calcareis Salerni, et in Gargano.

A *R. graveolenti* differt, foliorum petiolis reflexo-divaricatis, petalisque crenatis, nec undulato crispis; a *R. chalepensi* bracteis linearibus nec cordatis, petalis minime ciliatis.

54. Cucubalus angustifolius. Foliis lanceolato-linearibus acutis subcarnosis glabris integerrimis, calycibus campanulatis reticulato-venosis, petalis bifidis, capsulis trilocularibus. Perennis. *Prodr. pag. XXV. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 233. *tav.* 38.

In locis aridis et sterilibus obvius.

A *C. behen* differt floribus laxe paniculatis, non confertis, foliis lanceolato-linearibus, non ovato-lanceolatis; caule prostrato ramosissimo. A *Silene maritima* Smith. Fl. Brit. vol. 2. pag. 468. differt floribus paniculatis, non caulibus subtrifloris, radice minime repente, capsulis ovatis non subrotundis.

55. Silene canescens. Caulibus prostratis incurvis, villosis, foliis obovatis longe petiolatis, hirsuto-canescentibus, floribus spicato-racemosis, petalis bifidis, capsulis ovatis pedicellatis. Peren. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXV. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 236. *tav.* 39.

Habitat in arena littoris prope Neapolim, et Puteolos.

Proxima *S. sericeae All.* sed haec floribus terminalibus, ramis subtrifloris, foliis lanceolatis, capsulis subrotundis carpophoris duplo longioribus gaudet; a *Sil. bipartita* tamen differt floribus lateralibus, non paniculato-dichotomis, caule prostrato non erecto, foliisque crassioribus brevioribus.

56. Arenaria Rosani. Foliis lineari-lanceolatis mucronatis hirsutis striatis, caule erecto hirsuto subtrifloro, petalis obovatis, calycibus striatis duplo-longioribus. Planta sesquipollicaris. Perennis. *Prodr. pag. XXVI.*

Habitat in Lucania.

57. Sedum Notarjanni. Caule adscendente herbaceo, foliis planis petiolatis alternis ovatis, sinuato-dentatis, dentibus obtusis, floribus intrafoliaceis, sparsis, petalis acutis albis apice viridibus. Bienn. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXV. Fl. Nap. vol.* 1. *p.* 245. *tav.* 40.

Habitat in rupibus calcareis prope Fundos.

A *S. populifolio* differt floribus solitariis axillaribus, non paniculato-corymbosis.

58. Sedum deltoideum. Caule erectiusculo, foliis planis alternis, deltoideo-cuneiformibus inaequalibus crenatis, dentatisque, cymis lateralibus, petalis purpureis. Ann.

Habitat in Monte novo, prope Puteolos; in Insula Caprearum.

59. Sedum Magellense. Caule adscendente, foliis obovato-oblongis, sessilibus, foliis racemosis sparsis, breviter pedunculatis, petalis acutis luteis. Annuum. *Prodr. pag. XXVI.*

Habitat in nemoribus Magellae; prope Caramanicum.

60. Sedum rostratum. Foliis linearibus teretibus depressis sessilibus, basi solutis glaucis, caulis basi spiraliter sexfariam confertis, demum sparsis, cyma bifida pauciflora, petalis linearibus luteis, capsulis

Orto Botanico di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II

rostratis, calycibus acutis sesqui-longioribus. Peren. *Prodr. pag. XXVI.*

Habitat in rupibus calcareis prope Casertam, et in Lucania.

61. Sedum rufescens. Foliis ovalibus tereti-depressis sessilibus basi solutis incurvis glauco-rufescentibus aristatis, caulis basi spiraliter 5-fariam confertis, demum sparsis; cyma 4-fida 2-fida, petalis linearibus pallide luteis patentibus, capsulis rostratis calycibus obtusis duplo longioribus. Per. *Fl. Nap. p. XXVII. Fl. Nap. vol. 1. pag. 248. tav. 41.*

Sedum minus IV. Clus. hist. 2. pag. 60. An *S. rupestre, var. florib. pallidis*; Encyclop.?

Habitat in muris et tectis obvius.

Affinis *S. reflexo* et *rupestri*; a quibus differt foliis ovalibus tereti-depressis obtusiusculis non cylindraceis exquisite subulatis; caule erecto, petalis pallide luteis; cultura non immutatur.

62. Cerastium pilosum. Diffusum, pilosum; fol. ellipticis obtusis, calycibusque corollis longioribus, ciliato-piliosis; pilis patentibus mollissimis, floribus paniculatis, capsulis oblongis. Ann. *Prodr. p. XXVII.*

Habitat in montibus Samnii, et in Magella.

63. Cerastium praecox. Diffusum villoso-viscosum; fol. inferioribus spathulatis, superioribus ovato-oblongis, utrinque villosis, panicula ramosissima dichotoma, corollis calycibus duplo-longioribus, pedunculis capillaribus, capsulis oblongis. Annua. *Prodr. loc. cit.*

Alsine hirsuta magno flore. Bauh. p. 250.?

Habitat in arvis aridis prope Neapolim.

64. Cerastium Scarani. Diffusum, ramis flexuosis lanatis, pilis retroflexis, fol. lanceolato-oblongis acutis, utrinque tomentoso-viridibus, corollis calyce-duplo longioribus, capsulis ovatis, pedunculis fructificantibus horizontalibus. Perenne. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in montibus Samnii.

65. Cerastium Columnae. Diffusum; fol. linearibus tomentosis incanis, panicula dichotoma, corollis calyce duplo-longioribus, capsulis fructificantibus oblongis. Perenne. *Prodr. loc. cit.* Col. phytob. app. pag. 115. tav. 36. *C. tomentosum* Encyclop.

Habitat in nostris montibus commune.

A *C. tomentoso* differt foliis linearibus, capsisque oblongis.

66. Cerastium longifolium. Diffusum; ramis divaricatis, fol. lanceolato-linearibus, tomentosis sublanato-virescentibus, panicula dichotoma, corollis calyce duplo-longioribus, capsulis fructificantibus oblongis. Perenne. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in montibus Samnii.

67. Cerastium hirsutum. Diffusum; hirsuto-viscosum, caulibus repentibus, fol. oblongis obtusis, basi attenuatis hirsutis canescentibus, floribus paniculatis, corollis calyce duplo-longioribus, capsulis oblongis, subincurvis. Perenn. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in montibus Samnii.

68. Lythrum Graefferi. Foliis alternis lineari-lanceolatis, floribus solitariis axillaribus hexapetalis dodecandris. Perennis. *Fl. Nap. Pr. sup. II. p. XXVII.*

Habitat in montibus prope Casertam.

69. Euphorbia Neapolitana. Umbella 5-fida dichotoma, involucellis cordato-reniformibus mucronatis integerrimis, passim basi incisis, fol. lanceolato-oblongis, glabris retusis, petalis rostratis lunatis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XXVIII. Fl. Nap. vol. 1. p. 266. tav. 42.*

Habitat ad agrorum margines prope Neapolim.

E. provinciali, et *E. italicae Lmk.* affinis; ab illa differt foliis elliptico-oblongis, umbella quinquefida dichotoma, involucellis haud mucronatis, ramis fertilibus; *ab italica* foliis minime profunde dentatis, umbella 5-fida dichotoma, involucellis cordato-reniformibus denticulatis, non cordato-ovatis serratis.

70. Euphorbia ceratocarpa. Umbella 5-fida, 4-fida dichotoma, involucellis ovatis obtusis mucronatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis glaucis, capsulis glabris, verrucis coadunatis ramosis incurvis. Suffrutex.

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

Var. Caule humiliore, fol. acutiusculis, umbella diffusa ramosissima. *Fl. Nap. Prodr. loc. cit. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 268. *tav.* 43.

Habitat in maritimis Calabriae Ulterioris, et Apuliae.

Proxima *E. orientali*, sed caulis in hac herbaceus, in illa suffruticosus, capsulae glabre verrucis coadunatis ramosis obsitae, non pilosae laeves, differentiam constituunt. Icon *E. orientalis* Buxbaumii cent. 2. pag. 29. tab. 26., nostrae plantae minime quadrat.

71. Euphorbia caespitosa. Umbella 5-8-fida dichotoma, ramosissima, involucellis, cordato-semiorbiculatis integerrimis, foliis confertis lanceolato-linearibus obtusiusculis mucronatis, ramis floriferis, petalis lunatis, capsulis margine scabris, seminibus reticulato-griseis. Perenn. *Tithymalus linifolius, major italicus. Barr. rar.* 60. *ic.* 821. *An. Euphorbia pinea Lin.*? *Prodr. pag. XXIX. sub nomine E. linifoliae.*

Habitat in rupibus calcareis Insulae Caprearum.

72. Euphorbia Baselicis. Umbella multifida bifida, involucellis cordato-semiorbiculatis, foliis inferioribus obovatis, superioribus parabolicis, rotundatis, amplexicaulibus, petalis bicornibus, capsulis glabris. Suffrutex. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in Gargano.

73. Prunus cocomilia. Pedunculis geminis, fol. ovalibus utrinque glabris crenulatis, petiolis, crenisque glandulosis. *Prodr. sup. II. pag. LXVII.*

Habitat in saepibus Calabriae Ulterioris.

74. Potentilla apennina. Foliis ternatis, utrinque tomentoso-argenteis, foliolis ovalibus, apice bifidis, caule fruticoso-caespitoso, cauliculis floriferis filiformibus subtrifloris, receptaculis lanatis. *Pr. p. XXX. Fl. vol.* 1. *pag.* 291. *tav.* 46. *Heptaphyllum argenteum alpinum trifoliatum longius radicatum, saxatile sabaudum*, Bocc. mus. p. 20. tab. 9. f. 4.

Habitat in alpinis Aprutii, (*al Monte Amaro, al Majellone*), et in *Monte Cairo* prope *S. Germano.*

P. nitidae proxima, a qua tamen differt foliis ovalibus integris vel apice-bifidis, non cuneiformibus trifidis; caulibus multifloris, calycibus argenteo-sericeis, non subglabris purpureis. *Cl. Bocconius*, felicissimus plantarum scrutator, primus hanc plantam a *P. nitida* distinxit.

75. Potentilla Dethomasii. Foliis quinatis, radicalibus rariter septenatis, foliolis obovatis, grosse dentatis, utrinque sericeo-villosis, supra virescentibus subtus incanis, caule suberecto corymbifero, receptaculis hirsutis, petalis subrotundis emarginatis luteis. Perennis. *Prodr. sup. I. pag. LXI. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 285. *tav.* 44.

Habitat in Pollino.

Media inter P. rectam et argenteam. A *P. argentea* differt foliis dentatis, non incisis; corymbis compactis, petalis emarginatis, magnitudine florum, nec non sericea hirsutie totius plantae.

76. Potentilla calabra. Foliis quinatis cuneiformibus multifidis, utrinque tomentosis subtus candidissimis, caule prostrato, petalis calyce majoribus, receptaculo villoso. *Prodr. sup. II. pag. LXVII. Fl. Nap. vol.* 1. *pag.* 287. *tav.* 45.

Habitat in saxosis montium Calabriae; *al Pollino*, *alla Sila*, *a Monte Cucuzzo*, ec.

P. argentea habet folia subtus tantum tomentosa, minus incisa, et caulem erectum.

77. Helianthemum Barrelieri. Suffruticosum, stipulatum, caulibus rigidis erectis, foliis confertis, lanceolato-linearibus revolutis obtusis villosis, pedunculis villosis, petalis calyce majoribus. *Pr. p. XXXI. Chamaecistus luteus, thymifolius, polianthus.* Barr. rar. 517. ic. 449.

Habitat in Insula Caprearum, et in Lucania.

Ab *H. glutinoso* differt foliis brevioribus et latioribus, calycibus obtusis corollis duplo brevioribus; planta nullomodo glutinosa.

78. Helianthemum viride. Suffruticosum, stipulatum, caulibus flaccidis procumbentibus, foliis linearibus

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

acutis revolutis, glabris laetevirentibus, pedunculis villosis. *Prodr. loc. cit. Fl. Nap. vol.* 1. *tav.* 47.

Habitat in Insula Caprearum.

79. Helianthemum hyssopifolium. Suffruticosum stipulatum, foliis inferioribus ovalibus, superioribus lanceolato-linearibus, utrinque viridibus planis hirsutis, calycibus hirsutis, capsulis duplo longioribus. Planta hirta. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in collibus Lucaniae.

Affine *H. obscuro*, a quo differt foliis superioribus lanceolato-linearibus nec ellipticis, ac longitudine calycis; species intermedia inter H. obscurum et grandiflorum.

80. Clematis fragrans. Foliis compositis, decompositisque, foliolis ternatis, lobatisque ovatis, obtusis, integerrimis, petalis lanceolatis emarginatis patentibus, seminibus caudatis. *Prodr. pag. XXXII. Fl. Nap. vol.* 1. *tav.* 48.

Habitat in saepibus prope Bajas.

C. flammula habet folíola angusto-lanceolata laciniata, flores parvos, hinc a nostra diversa.

81. Ranunculus brutius. Calycibus patulis, foliis ternato-quinquepartitis, foliolis tripartitis, laciniis lanceolatis bifidis utrinque pubescentibus, petalis luteis calyce duplo longioribus, pedunculis teretibus, caulibusque villosis, radice fibrosa. Perennis. *Prodr. sup. II. pag. LXI. Fl. Nap. vol.* 1. *tav.* 50.

Habitat in monte Pollino.

Affinis *R. acri*, a quo differt foliorum laciniis latioribus undique serratis, glabriusculis, nec villosis apice tantum vix dentatis, corollis duplo majoribus aureo-lutescentibus; a *R. polyanthemo* foliis digitato-partitis glabriusculis, pedunculis teretibus nec striatis diversus.

82. Ranunculus brevifolius. Foliis radicalibus reniformibus coriaceis apice trilobis, lobis lateralibus subcrenatis, intermedio usque ad folii tertiam partem producto, petiolis flexuosis, caulino sessili cuneiformi tripartito, caule incurvo unifloro. *Prodr. sup. II. pag. LXVIII.*

Habitat in saxosis Magellae.

Affinis *R. Thorae* a quo differt foliis non apice emarginatis ac totu ambitu crenatis, sed profunde trilobatis lineas sex lata, et tres longa, caule folio unico minime instructo, non inferiori maximo reniformi, ut in *thora*, ac toto habitu.

83. Ranunculus magellensis. Foliis radicalibus cordato-reniformibus apice trilobis, lobis crenatis, caulino lanceolato, integerrimo, caule subunifloro. Petala alba.

Habitat in alpinis Magellae.

Affinis *R. alpestri*, a quo differt foliis trilobatis, lobis crenatis, nec tripartitis, laciniis trilobatis. *Prodr. loc. cit.*

84. Ranunculus Thomasii. Foliis radicalibus ternatis, foliolis tripartito-trifidis, supra glabris, subtus villosis, caulinis mediis tripartitis; summis integerrimis linearibus, laciniis linearibus, caule simplici, vel bifido, calycibus patentibus, pedunculis teretibus. Planta villoso-sericea. *Prodr. loc. cit.* Species intermedia inter. R. *flabellatum et millefoliatum.*

Habitat in vallibus Silae Calabriae Citerioris, in loco vulgo dicto: *Vallone del Crocefisso.*

85. Satureja tenuifolia. Pedunculis axillaribus solitariis, 3-6-floris, bracteis calyce brevioribus, foliis inferioribus ovato-lanceolatis, superioribus lanceolato-linearibus, acuminatis revolutis, hispidis, caule suffruticoso ramoso, ramis filiformibus. *Prodr. pag. XXXIII.*

Habitat in collibus Apuliae.

86. Sidertis brutia. Suffruticosa, tomentoso-lanata, foliis oblongis crenulatis dense lanatis, floribus verticillato-spicatis, bracteis ampliatis cordatis mucronatis glabriusculis, lacte-viridibus, corollis luteis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in monte Pollino Calabriae Citerioris.

87. Mentha Pyramidalis. Floribus capitatis, foliis ellipticis acuminatis, inaequaliter serratis hirsutis pe-

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

tiolatis, staminibus corolla brevioribus. Perenn. *Pr. loc. cit.*

Habitat in fossis prope Neapolim, et in rivulis Principatus Ulterioris.

88. Mentha macrostachya. Spicis elongatis, fol. ovato-ellipticis, argute inaequaliter serratis hirsutis sessilibus. Perennis. *Prodr. pag. XXXIII.*

Habitat in locis humidis communis.

89. Lamium longiflorum. Foliis cordatis bidentatis laeviusculis, breviter petiolatis, caulibusque hirsutis, verticillis sub-10-floris, corollae tubo calyce duplo longiore, dente unico setaceo. Perenne. *Prodr. pag. XXXIV.*

Habitat in Magella, prope rivulos.

90. Lamium flexuosum. Foliis cordato-ovatis grosse dentatis, passim bidentatis, maculis sparsis, caulibus debilibus basi flexuosis, verticillis sub-10-floris, corollae tubo calycis longitudine. Perenne. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in sylvis, et saepibus umbrosis.

91. Stachys polystachia. Viridi-tomentosa, verticillis multifloris, foliis radicalibus ovalibus, basi cordatis, caulinisque cordato-ovatis, inaequaliter crenatis, floralibus lanceolatis serratis, verticillis subspicatis, caule ramoso. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in sylvis prope Neapolim, et alibi.

92. Stachys salviaefolia. Albo-tomentosa, verticillis multifloris, foliis oblongo-ellipticis, obtusis crenatis, verticillis subspicatis, caulibus simplicibus. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in arvis incultis Principatus Ulterioris, Aprutii et Lucaniae.

93. Stachys pubescens. Verticillis sex-floris subspicatis, foliis ovato-lanceolatis, acutis, basi attenuatis, dentatis quinque nerviis pubescentibus, caule decumbente, calycibus lanatis inermibus. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in Lucania.

94. Marrubium apulum. Foliis cordato-subrotundis inaequaliter duplicato crenatis, plicato-undulatis supra viridibus, flocoso-tomentosis, albo marginatis, subtus dense tomentosis, calycibus 10-dentatis, dentibus villosis patentibus uncinatis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in Apulia.

95. Phlomis ferruginea. Foliis oblongis basi-cordatis, crenatis supra viridibus, albo marginatis, subtus ferruginoso-tomentosis, involucris lanceolatis, caule fruticoso lanato. *Prodr. pag. XXXV.*

Habitat in Lucania.

96. Thymus Marinosci. Capitulis arcte imbricatis, bracteis ovato-oblongis, foliisque linearibus planis, undique punctatis, laevibus ciliatis, caule fruticoso. *An. T. striatus. Vahl.? Prodr. loc. cit.*

Habitat cum praecedente.

97. Thymus virgatus. Pedunculis axillaribus, subtrifloris, cymosis bracteatis, foliis linearibus obtusis scabris, margine revolutis, caulibus erectis suffruticosis rigidis virgatis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in aridis prope Martinam.

98. Thymus acinoides. Floribus dense verticillatis subsessilibus, verticillis 6-floris, caulibus adscendentibus suffruticosis simplicibus, foliis inferioribus ovatis ellipticis, obtusis petiolatis, superioribus lanceolatis subintegerrimis, acutis impunctatis, utrinque viridibus; corollis calycibus duplo longioribus. *Pr. loc. cit.*

Habitat in collibus aridis Lucaniae.

99. Euphrasia pectinata. Foliis inferioribus ovatis, superioribus subrotundo-ovatis, pectinato-dentatis, dentibus setaceis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. Annua. *Prodr. pag. XXXVI.*

Habitat in pratis Magellae.

Ab *E. salisburgensi* differt, foliis ovatis, bracteisque late-cordatis.

100. Antirrhinum pallidum. Caule repente, foliis reniformibus obiter quinquelobis, oppositis pubescentibus glaucis, floribus longe pedunculatis concoloribus. Annuum. *Prodr. loc. cit. sub nomine A. pubescentis.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Habitat in fissuris rupium prope rivulos Magellae, in loco vulgo dicto : *Valle Buglione*.

101. Antirrhinum acutangulum. Foliis alternis cordato-reniformibus 5-lobis glabris, lobis acutis mucronatis. Planta tenerrima, gracilis. *Prodr. sup. II. pag. LXIX.*

Habitat in fissuris rupium Pedemontii Aliphani.

102. Scrophularia grandidentata. Foliis cordato-oblongis laevibus profunde bidentatis, dentibus divergentibus, subtus pubescentibus, panicula racemosa terminali, pedunculis trichotomis ; caule, petiolisque villosis. *Prodr. sup. II. pag. LXVIII.*

Habitat in nemoribus Matesii, Magellae.

A *Betonicaefolia*, cui affinis, differt foliis bidentatis nec dentibus integerrimis, foliis latioribus laevibus ; a *S. scorodonia* et *biserrata*, foliis revera profunde bidentatis, dentibus divergentibus, nec argute serratis, racemo aphyllo etc.

103. Iberis stylosa. Herbacea ; foliis subcarnosis, inferioribus ovalibus, basi spathulatis, petiolatis subintegerrimis, caulinis amplexicaulibus oblongis obtusis ; siliculis obcordatis, stylis duplo brevioribus. Planta pollicaris biennis. *An. Thlapsi minimum. Ard. spec. 2. pag. 37. tav. 15. fig. 1.? Prodr. pag. XXXVII.*

Habitat in editioribus montis *Amari* in Aprutio.

104. Alyssum rupestre. Caulibus erectis suffruticosis subnudis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque argenteo-canis, racemis simplicibus, siliculis obovatis. Floribus albis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in fissuris rupium Magellae.

105. Alyssum diffusum. Caulibus herbaceis diffusis, foliis incanis lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, racemo simplici. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in alpinis Aprutii.

106. Alyssum cuneifolium. Caulibus herbaceis diffusis, foliis incanis obovato-cuneatis subcarnosis, racemo simplici. *Prodr. loc. cit.*

Habitat cum praecedente.

107. Biscutella marginata. Siliculis undique scabris, margine fuscis, caule subnudo, foliis lyratis lobis obtusis, impari maximo subrotundo, bidentatis pilosis. *Prodr. pag. XXXVIII.*

Habitat in maritimis Insulae Caprearum.

108. Biscutella maritima. Siliculis laevibus, margine ciliatis concoloribus ; caule subnudo, foliis lyratis, lobis obtusis, impari maximo elliptico, grosse bidentatis, pilosis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat ibid.

109. Biscutella Columnae. Siliculis undique scabris, foliis obovatis in petiolum attenuatis, dentatis hispidis, caule subaphyllo hispido, ramis approximatis. *Prodr. loc. cit. Jondraba alyssoides apula spicata.* Col. ecphr. 1. pag. 283. 1. 284. fig. 1. Bar. ic. 253. t. 1.

Habitat in Apulia et Lucania.

Var. foliis sinuato-lyratis.

In Col. et Bar. l. c. t. 1. 2. duo icones extant ab auctoribus sub Biscutella apula indistincte refertae, quarum alterae ad veram. *B. apulam* pertinent ; primae vero ad nostram : ab illa satis distinguenda, foliis, ramificatione, ac toto habitu.

110. Hesperis heterophylla. Caule ramoso diffuso hispido ; foliis inferioribus ellipticis subintegerrimis, superioribus ovato-lanceolaiis, ovalibusque, dentato-angulosis, pubescentibus, petalis integerrimis, siliquis arcuatis torulosis pedunculatis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in agris umbrosis Aprutii, Principatus Ulterioris etc.

111. Arabis collina. Caule adscendente simplici, foliis obovatis obtuse dentatis utrinque scabris, caulinis oblongis obtusis, siliquis compressis strictis. *Prodr. pag. XXXIX.*

Habitat in collibus aridis prope Neapolim.

112. Brassica incana. Siliquis glabris cuspidatis subteretibus, foliis radicalibus lyratis tomentoso-incanis, sinuato-dentatis, caulinis sinuato-erosis auriculatis, supra glabriusculis. *Prodr. loc. cit.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Habitat in rupibus Insulae Caprearum, et prope Neapolim in locis vulgo dictis : *Camaldoli*, *Capo di Coruoglio*, *Bagnoli* etc.

113. Brassica Gravinae. Foliis oblongis lyrato-runcinatis, lobis lateralibus integerrimis extimo dentato, hispidis, petiolis trinervatis, caule hispido, calyce patulo, floribus luteis. Perenn. *Ibid.*

Habitat in montibus Aprutii Ulterioris prope Sulmonam, et in monte Matesio.

114. Brassica hispida. Foliis lyrato-runcinatis dentatis, hispidis, caule hispido herbaceo, siliquis stylo obtusiusculo, calyce conniventi, petalis erectis albis fusco-venosis. Annua. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in arvis Lucaniae.

115. Sinapis apula. Siliquis laevibus patentibus, stylo oblongo compresso, foliis runcinato-pinnatifidis glabris, laciniis omnibus lanceolatis dentatis acutis. *Ibid. loc. cit.*

Habitat in arvis Apuliae.

116. Erodium Gussonii. Pedunculis multifloris longissimis, foliis cordatis lobatis obtusis dentatis glaucis, caule, petiolisque hirtis, corollis calycibus aristatis duplo longioribus. Perennis. *Prodr. pag. XXXIX.*

Habitat in pratis apricis Principatus Ulterioris, et prope Martinam.

117. Geranium villosum. Pedunculis bifloris orbiculato-cordatis novemlobis, lobis trifidis obtusis, corollis calyce duplo longioribus, petalis emarginatis; caule erecto. Planta villosa, pilis mollissimis horizontalibus obsita. Ann. *Prodr. sup. I. pag. LXII.*

Habitat in paludibus Silae.

118. Geranium nemorosum. Pedunculis bifloris, foliis reniformibus, palmato-septempartitis, lobis cuneiformibus trifidis, laciniis tridentatis, caule erecto ramoso, petalis reticulato-venosis integerrimis. Planta pubescens, perennis. *Prodr. loc. cit.*

Affinis *G. pyrenaico* a quo differt foliis profunde sectis, petalisque integerrimis.

Habitat in nemoribus Principatus Ulterioris, Calabriae Citerioris et Samnii.

119. Malva vulgaris. Caule diffuso prostrato herbaceo, foliis septemlobatis, lobis rotundatis obtusis, crenato-dentatis, calyce exteriore triphyllo, foliolis lanceolatis, corollis calycibus quadruplo longioribus. Planta subbispida. Biennis. *Prodr. sup. I. pag. LXII.*

Habitat in ruderatis communis.

120. Malva Alceoides. Caule erecto, foliis radicalibus orbiculato-cordatis septemlobatis, inferioribus septempartitis, laciniis cuneiformibus incisis, apice dilatatis; superioribus palmato-quinque partitis, laciniis pinnatifidis; calycis exterioribus foliolis lanceolatis, interioribus laciniis ovato-lanceolatis acutis. Planta hispido-scabra, pilis fasciculatis expansis. Peren. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in sylvis prope Neapolim, in loco vulgo dicto : *Camaldoli.*

121. Lavatera sylvestris. Caule herbaceo, hispido-scabro, foliis inferioribus quinquelobo-angulatis, superioribus trilobis, lobo medio duplo longiore, lobis lanceolatis acutis dentatis, pedunculis solitariis folio brevioribus, capsulis denudatis. *Prodr. pag. XL.*

Habitat ad sylvarum margines Principatus Ulterioris, et Aprutii.

122. Lavatera Neapolitana. Caule herbaceo erecto, ramis patentibus, foliis septemlobatis obtusis, pedunculis axillaribus aggregatis, calyce interiore, exteriore duplo longiore, laciniis acuminatis. Planta hispido-scabra, pilis fasciculatis. Perennis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in maritimis Pausylippi et alibi.

123. Genista anxantica. Foliis ovato-ellipticis subcoriaceis glaberrimis venosis, ramis angulatis diffusis, leguminibus glabris, racemis terminalibus. Perennis. *Fl. Nap. Prodr. pag. XLI.*

Habitat in collibus aridis, vallis Anxanti, Principatus Ulterioris.

Orto Botanico di Napoli, Universita degli Studi di Napoli Federico II

124. Ononis diffusa. Floribus subsessilibus lateralibus; foliis ternatis cuneatis glabris, stipulisque lanceolatis argute-denticulatis, calycibus scariosis, corollis purpureis, brevioribus. Annua. *Ibid. loc. cit.*

Habitat in aridis incultis *Bagnolí.*

125. Ononis oligophylla. Caule adscendente villoso, foliis simplicibus orbiculatis, stipulisque ovatis glabris crenulatis; floribus racemosis, subpedunculatis, solitariis, calycibus villosis corolla brevioribus. Annua. *Prodr. pag. LXIX.*

Habitat in pratis Principatus Ulterioris, et Lucaniae.

Affinis *O. albae*, a qua differt fig. folior., magnitudine corollarum, caule adscendente etc.

126. Ervum longifolium. Pedunculis multifloris, leguminibus glabris hexaspermis, folio cirrhoso, foliolis linearibus acuminatis. Annuum. *Ibid. loc. cit. Vicia gracilis.* Lois.

Habitat in Lucania.

127. Ervum lentoides. Pedunculis subbifloris, leguminibus glabris dispermis; foliolis inferioribus ellipticis, superioribus oblongis obtusis, stipulis semi-sagittatis basi dentatis. Planta pubescens. Annua. *Pr. sup. II. pag. LXVIII.*

Habitat in arvis Lucaniae.

Affinis *E. lenti*, a quo differt stipulis dentatis, magnitudine etc.

128. Ervum uniflorum. Pedunculis unifloris, leguminibus glabris dispermis, folio non cirrhoso, foliolis oblongis obtusis, infimis obcordatis. Annuum. *Ibid. loc. cit.*

Habitat ibid.

129. Vicia ochroleuca. Pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis ovato-lanceolatis, obtusis mucronatis glabris, stipulis semisagittatis lineari-subulatis integerrimis. Perennis. *Ibid. pag. XLII.*

Habitat in saepibus Insulae Caprearum, et prope Stabias.

130. Hyppocrepis glauca. Leguminibus pedunculatis confertis, rectis vel subarcuatis, scabris, margine interiore 5-sinuato, foliolis oblongo-linearibus glaucis, calycibus pubescentibus. Perennis. *Ib. p. XLIII.*

Habitat in fissuris rupium Magellae.

Ab *H. comosa* differt leguminibus duplo longioribus unico latere excavatis, foliisque glaucis.

131. Orobus variegatus. Foliis bi-trijugisve, foliolis late-ovatis acuminatis stipulis ovato-semi-sagittatis integerrimis, caule simplici, laciniis calycinis setaceis, racemis subvigintifloris. Perennis. *Pr. sup. I. pag. LXII. Colum. phytobas. pag.* 59. *tav.* 14.

Habitat in sylvis prope Neapolim communis.

Ab *O. verno* differt, dentibus calycinis lanceolatis, racemo compacto multifloro, corollis vexillo reticulato-venoso.

132. Melilotus Neapolitana. Leguminibus monospermis obovatis obtusis, nudis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus, caule erecto, foliolis deltoideo-obovatis, apice dentatis, stipulis setaceis integerrimis, floribus patentibus. Annua. *Prodr. sup. I. pag. LXVI.*

Habitat in collibus apricis prope Neapolim.

133. Melilotus longifolia. Leguminibus monospermis subrotundis obtusis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus, caule erecto angulato, foliolis oblongo-linearibus serrulatis obtusis. Annua. *Ibid. loc. cit.*

Habitat in arvis Lucaniae.

A *M. lineari* differt foliolis linearibus integerrimis, et caule vix ramoso.

134. Melilotus rotundifolia. Leguminibus monospermis subrotundis obtusis arcuatim rugosis, racemis folio longioribus, caule erecto angulato, foliolis obovato-subrotundis, retusis denticulatis, stipulis dentatis. Annua. *Ibid. loc. cit.*

Habitat in collibus prope Neapolim, et in Lucania.

A *M. italica* differt leguminibus monospermis, foliisque dentatis emarginatis.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

135. Trifolium rupestre. Spica terminali globosa villosa pedunculata, calycinis dentibus setaceis patulis corollam aequantibus, caulibus subsimplicibus basi suffruticosis, foliolis rhombeo-obovatis glabris serrulato-spinulosis venosis. Perenne. *Ibid. pag. XLIII.*

Habitat in rupibus Magellae.

136. Trifolium tenuiflorum. Spicis cylindricis villosis, cinctis foliis oppositis sessilibus, dentibus calycinis subulatis mucronatis rigidis longitudine corollae, foliolis obovato-cuneatis serrulatis villosis. Annuum. *Prodr. pag. XLIV.*

Habitat in sylvis prope Neapolim.

137. Trifolium tenuifolium. Capitulis globosis terminalibus subgeminatis, cinctis foliolis oppositis sessilibus, calycibus villosis, dentibus setaceis inaequalibus, corolla brevioribus, foliolis inferioribus obcordato-cuneatis, superioribus linearibus obtusis, denticulatis pilosis, caule simplici erecto villoso. Annuum. *Ibid.*

Habitat ibid.

138. Lotus ciliatus. Leguminibus solitariis cylindraceis glabris sessilibus, caulibus prostratis, foliis glabris margine, calycibusque ciliatis. Annuum. *Ibid.*

Habitat in pratis humidis Silae.

139. Medicago cancellata. Pedunculis subbifloris folio brevioribus, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque planis, anfractibus quinis distantibus, aculeis setaceis arcuatis distichis adpressis subpilosis, stipulis subdentatis integerrimisve, foliolis obovatis denticulatis. Planta pubescens. Annua. *Ibid.*

Habitat in agris.

140. Medicago histrix. Pedunculis subbifloris folio longioribus, leguminibus cochleatis cylindricis utrinque compressis, anfractibus quinis subdistantibus, aculeis distichis subulatis divergentibus rectis uncinatis subpilosis; stipulis pectinato-multifidis, foliolis obovatis retusis denticulatis. Planta glabra. Annua. *Pr. pag. XLV.*

Habitat ibid.

A *M. ciliari* differt leguminibus glabris, pedunculisque multifloris.

141. Medicago flexuosa. Pedunculis multifloris, leguminibus cochleato-flexuosis glabris, anfractibus binis reticulatis, margine aculeatis, aculeis distichis arcuatis brevibus, stipulis ciliato-dentatis; foliolis obovatis retusis dentatis. Planta glabra. Annua. *Ib.*

Habitat ibid.

142. Medicago arenaria. Pedunculis subbifloris folio brevioribus, leguminibus cochleatis subcylindricis utrinque planis, anfractibus quaternis approximatis, aculeis raris distichis arcuatis divergentibus uncinatis glabris, stipulis subdentatis, integerrimisve, foliolis obovatis denticulatis. Planta pubescens. Ann. *Prodr. pag. XLV.* sub nomine *M. littoralis.*

Habitat in arenosis Puteolorum.

143. Medicago agrestis. Pedunculis subbifloris leguminibus cochleatis muricatis utrinque planis, anfractibus quinis, aculeis leguminum latitudine aequantibus, subulatis rectis uncinatis; stipulis setaceo-dentatis; foliolis cuneiformibus apice dentatis. Planta pubescens. Annua. *Ibid.*

Habitat in agris prope Casertam.

Affinis *M. Gerardi*, a qua differt caulibus pedem et ultra decurrentibus etc. *Prodr. sup. II. loc. cit.*

144. Apargia cichoracea. Scapo squamoso unifloro glabro, foliis obovatis, basi dentato-runcinatis glabriusculis, petiolis hirtis, pilis furcatis, calycinis squamis acutis hirtis, radice tuberosa fasciculata. Perennis. *Prodr. pag. XLVI.*

Habitat in pratis montuosis Stabiarum, et Lucaniae.

145. Apargia lyrata. Scapo nudo unifloro, calyceque hispido, foliis lyrato-pinnatifidis, laciniis rotundatis, alterne dentatis hispidis, pilis trifurcatis, radice fusiformi. Perennis. *Ibid. loc. cit.*

Habitat in pratis prope Neapolim.

146. Apargia saxatilis. Scapo subramoso, subfolioso,

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

calyceque hispido, foliis pinnatifido-dentatis hispidis, pilis furcatis. Perennis. *Prodr. loc. cit. Hieracium alterum saxatile montanum.* Colum. ecphr. 1. p. 244. t. 243.

Habitat in montibus calcareis communis.

147. Hypochaeris pinnatifida. Caule ramoso basi hispido, foliis radicalibus runcinato-pinnatifidis, laciniis lanceolatis repandis subintegris, caulinis linearibus, basi multifidis integerrimisve hispidis, pilis simplicibus. Perennis. *Prodr. loc. cit.* sub nomine *Apargiae.*

Habitat in pratis montuosis Matesii, et Pollini.

148. Hedypnois coronopifolia. Subacaulis, scapis diffusis, foliis oblongo-spathulatis obtusis, profunde dentato-hispidis, pilis trifurcatis, calycibus hispidis, pedunculis incrassatis. Annua. *Prodr. pag. XLVI.*

Habitat in arvis aridis Lucaniae.

149. Hedypnois tubaeformis. Caulibus diffusis recurvis ramosis, foliis obovato-spathulatis subdentatis hispidis, pilis simplicibus, calycibus hispidis, pedunculis clavatis fistulosis maximis. Annua. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Insulae Caprearum, et Lucaniae.

150. Crepis corymbosa. Foliis radicalibus obovato-runcinatis, caulinis lanceolatis, basi sagittato-multifidis, caule basi ramoso, floribus corymboso-paniculatis, calycibus hispidis. Annua. *Cychorium sylvestre alterum.* Col. ecphr. II. p. 235. t. 236. ? *Prodr. pag. XLVII.*

Habitat in arvis prope Neapolim communis.

151. Crepis cernua. Foliis radicalibus, obovatis, lyrato-pinnatifidisque, angulato-dentatis glabriusculis, caulinis lanceolatis basi hastatis, caule simplici erecto superne ramoso, calycibus glabris, pedunculis cernuis. Annua. *Prodr. loc. cit.*

Habitat ibid.

152. Crepis lacera. Foliis hispidis runcinatis pinnatifidis bipinnatifidisque, summis lanceolatis basi pinnatifidis, calycibus albo-tomentosis laevibus, squamis

exterioribus linearibus adpressis. Planta bipedalis. Perennis. *Prodr. sup. II. loc. cit.*

Habitat in apricis montanis communis.

Media inter *C. biennem* et *C. dioscoridis*; ab illa differt foliis laceris, calycibus laevibus squamis exterioribus depauperatis minime ovatis; a *C. dioscoridis* foliis hispidis laceris, floribus triplo majoribus, calycibus haud pilosis, fructigeris cylindricis, perennitate, aliisque notis.

153. Hieracium pseudo-pilosella. Foliis lanceolatis, petiolatis integerrimis pilosis, scapo subaphyllo unifloro, undique piloso; stolonibus reptantibus, calyce dense sericeo-villoso. Perennis. *Prodr. sup. II. pag. LXIX.*

Habitat in pascuis Magellae.

154. Carduus corymbosus. Foliis interrupte-decurrentibus, supra glabriusculis subtus tomentosis, laciniis palmato-angulatis, ciliato-spinosissimis, caule corymboso, floribus solitariis pedunculis tomentosis; calycinis squamis erectis subulatis villosis. Annuus. *Prodr. pag. XLVIII.*

Habitat in incultis Principatus Ulterioris, Samnii et Aprutii.

155. Cnicus strictus. Foliis semidecurrentibus lanceolatis sinuatis, lobis bifidis spinosis, subvillosis, floribus terminalibus glomeratis sessilibus, calycinis squamis patulis lanceolatis, subulato-spinosis. Peren. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in saepibus montuosis Vesevi, Montis Virginis etc.

156. Gnaphalium nivale. Caule herbaceo simplicissimo, foliolis obovato-spathulatis obtusis, utrinque dense tomentosis, floribus terminalibus sessilibus aggregatis, bracteis ovali-oblongis dense lanatis, radiato-patentibus, calycibus tomentosis, squamis margine fuscis. Perenne? *Prodr. loc. cit.*

Habitat in editioribus Magellae, prope nives.

A *G. leontopodiode* differt foliis obovatis, utrinque tomentosis, non lineari-lanceolatis, subtus tantum tomentosis.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

157. Senecio foeniculaceus. Corollis revolutis, foliis subvillosis, inferioribus petiolatis, ovalibus sinuatis dentatis, superioribus amplexicaulibus oblongis, sinuato-pinnatifidis dentatis, summis lanceolatis denticulatis, radio paucifloro, floribus corymbosis. Annuus. *Prodr. pag. XLIX. Jacobea annua Senecionis folio foeniculi odore.* Tilli hort. pisan. p. 76. tav. 28. icon. mala.

Habitat in sylvis prope Neapolim.

158. Arnica lanigera. Foliis ovato-lanceolatis per petiolum decurrentibus, summis amplexicaulibus acuminatis, inaequaliter dentatis lanuginosis, caule striato lanato; calycinis laciniis lineari-subulatis. Peren. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Aprutii Ulterioris.

159. Doronicum columnae. Foliis dentato-angulatis scabriusculis, radicalibus cordato-reniformibus longe petiolatis, inferioribus auriculatis, mediis spathulato-cordatis, summisque ovato-lanceolatis, rotundatis amplexicaulibus, caule unifloro glabro. Perenne. *Prodr. pag. XLIX. Doronicum nigra radice campoclarense.* Column. ecphr. II. tav. 46.

Habitat in sylvis montuosis borealibus.

160. Pyretrum tenuifolium. Foliis bipinnatis villosis, foliolis lanceolatis omnibus distinctis, inciso-serratis, serraturis mucronato-aristatis, pedunculis corymbosis. Perennis. *Prodr. pag. L.*

Habitat in nemoribus Magellae.

161. Anthemis Barrelieri. Fol. pinnatis, pinnis triquinquepartitisve sericeo-tomentosis, calycinis squamis margine sphacelatis glabriusculis, corollis concoloribus albis, radii subrotundis, caulibus simplicibus unifloris procumbentibus. Perennis. *Pr. p. L. Chamaemelum montanum incanum absynthoides italicum.* Bar. ic. 457.

Habitat in saxosis Magellae et Pollini.

162. Anthemis petraea. Fol. pinnatis glabris subcarnosis, pinnis tri-quinquefidisve obtusis, calycinis squamis margine sphacelatis glabris, corollis discoloribus, radii ellipticis, caulibus simplicibus adscendentibus unifloris. Perenn. *Prodr. loc. cit.*

Habitat ibid.

163. Achillea punctata. Fol. bipinnatis utrinque villoso-punctatis circumscriptione ovali, foliolis linearibus trifidis incisisque mucronatis, corymbo composito compacto multifloro, floribus sulphureis. Perenn. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Magellae et Matesii.

164. Centaurea spathulata. Calycibus ciliatis, squamis intimis scariosis fuscis, fol. inferioribus sublyratis, superioribus spathulatis serratis scabris, summis oblongo-ellipticis obtusis integerrimis. Perennis. *Prodr. pag. LI.*

Habitat in rupibus calcareis Magellae, prope Sacellum S. Spiritus.

165. Centaurea dissecta. Calycibus ciliatis, squamis omnibus uniformibus nigro-maculatis, ciliis albis, fol. inferioribus pinnatifidis, laciniis remoto lanceolato-linearibus subintegerrimis scabris, sublanuginosis, summis lanceolato-linearibus subdentatis. Peren. *Prodr. loc. cit.*

Habitat cum praecedente.

166. Centaurea ceratophylla. Calycibus ciliato-spinosis, fol. caulinis pinnatis, radicalibus bipinnatis, pinnis lanceolatis linearibusque lanuginosis, caule adscendente laevi, lanuginoso. Perenn. *Prodr. loc. cit. An. Jacea montana lutea minima tenuifolia.* Colum. ecphr. I. pag. 36. tav. 35. fig. 2.?

Habitat ibid.

167. Centaurea incana. Calycibus scariosis ovatis, squamis laceris submuticis, medio nigro-maculatis, fol. inferioribus lyrato-pinnatifidis, lobis lanceolatis obtusis, mucronatis, utrinque tomentoso-incanis integerrimis. Perenn. *Prodr. pag. LII.*

Habitat ibid.

168. Centaurea deusta. Calycibus scariosis ovatis, squamis laceris submuticis, medio longitudinaliter nigro-maculatis, fol. inferioribus bipinnatifidis, superiori-

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

bus pinnatis, pinnis lanceolato-linearibus integerrimis. Perenn. *Prodr. pag. LI.*

Habitat in collibus aridis apricis prope Neapolim.

A *C. amara* differt calycibus ciliato-serratis, nec scariosis, foliisque ovatis.

169. Orchis pseudo-sambucina. Bulbis subpalmatis, labello trilobo, lobis ovatis intermedio minore emarginato, omnibus crenatis subincisis, petalis exterioribus reflexis, cornu conico adscendente germine longiore; bracteis foliaceis floribus duplo-longioribus. *Prodr. pag. LII.* sub nomine *O. bracteatae.*

Habitat in collibus aridis prope Puteolos.

170. Orchis Cyrilli. Bulbis subrotundis, labello laeviter trilobo, lobo intermedio emarginato, lateralibus crenato-erosis subincisisque, petalis exterioribus patentibus, cornu germine subaequante adscendente, bracteis germine brevioribus, fol. maculatis. *Prodr. loc. cit.* (*Orchis pallens. Cyrilli icon. ined. non Will.*)

Habitat in sylvis prope Neapolim.

171. Orchis pauciflora. Bulbis subrotundis, labello lato convexo laeviter trilobo, lobo medio integerrimo punctis regularibus inscripto, petalis exterioribus reflexis, interioribus rotundatis, cornu adscendente germine subaequante, bracteis germine brevioribus. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Lucaniae.

172. Orchis quadripunctata. Bulbis subrotundis, labello tripartito laciniis lateralibus ovatis, media obovata majore subemarginata, quadripunctata, petalis patentibus obtusis, cornu germine subaequante recto filiformi, bracteis germine brevioribus. *Prodr. pag. LIII.*

Habitat in pratis Apuliae.

173. Orchis Nicodemi. Cyrilli icon. ined. Bulbis, subrotundis, labello trilobo, lobis ovalibus dilatatis subaequalibus crenulatis, medio subemarginato punctato, petalis exterioribus patentibus acutis, cornu

germine subaequante adscendente, bracteis germine longioribus. *Prodr. loc. cit.*

Habitat ibid.

174. Orchis parviflora. Bulbis subrotundis, labello tripartito, lacinia intermedia elongata emarginata denticulo interjecto, laciniis omnibus oblongis obtusis crenulatis, petalis conniventibus exterioribus subulatis, cornu germine triplo breviore, bracteis germine brevioribus, foliis maculatis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Lucaniae.

Hoc nomen servandum, quum *parviflora.* Will. nihil aliud sit nisi *ustulata* vera, ut in culta edoctus fuit. Claris. Balbis, ac mihi in literis benevole comunicavit.

175. Orchis saccata. Bulbis subrotundis, labello obovato integro crenulato, petalis conniventibus cornu ampliato, scrotiformi triplo germini breviore, bracteis germine longioribus, foliis maculatis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in pratis montuosis Lucaniae.

176. Helleborine longipetala. Labello trilobo, lobis lateralibus obtusis, medio lanceolato acuminato elongato, basi barbato, bracteis maximis coloratis.

Habitat in aridioribus, ad Vesevi basim, loco vulgo dicto: *il Mauro*, *le Mortelle* etc.

177. Alnus cordifolia. Foliis ovatis, basi cordatis acutiusculis serratis nitidis, axillis venarum subtus villosis. *Prodr. pag. LIV.*

Habitat in vallibus prope Neapolim, et in nemoribus montuosis Principatum et Calabriarum.

178. Quercus frainetto. Foliis obovatis dilatatis pinnatifido-sinuatis subtus pubescentibus, laciniis oblongis obtusis; calycibus fructus haemisphaericis, squamis lanceolatis villosis adpressis. *Prodr. sup. II. pag. LXIX.*

Habitat in nemoribus Calabriae Ulterioris, prope *Rogliano.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

A *Q. cerri* differt imprimis capsulis minime echinatis.

179. Pinus brutia. Foliis geminis rigidis glaberrimis planiusculis ; strobilis ovatis glabris geminis , pedunculatis , foliis triplo brevioribus , squamis obtusis. *Prodr. loc. cit.*

Habitat in finitimis montibus Calabriae Ulterioris: in *Aspromonte* etc.

Affinis *P. Halepensi* et *maritimae* ; differt ab illa strobilis ovatis , foliis triplo brevioribus , nec conicis foliis subaequantibus ; a *P. maritima* foliis crassioribus rigidis , strobilis minoribus.

180. Acer Neapolitanum. Foliis subrotundis quinquelobis acutiusculis , subtus pubescentibus , grosse dentatis , corymbis pendulis , pedunculis , samarisque pilosis , alis semipatentibus. Arbor excelsa Polygamo-dioica.

Habitat in siccis et montosis prope Neapolim , in loco vulgo dicto : *li Camaldoli* ; in collibus Amalphitanis et Surrentinis , praecipuae prope Stabias , in loco vulgo dicto : *Quì si sana* ; in montibus Samnii , Aprutii et alibi.

Ab *acero* obtusata Will. differt corymbis pendulis nec erectis , foliis profunde quinquelobis dentatis , non integerrimis. Ab *acero opulo* differt magnitudine , corymbis pendulis nec laxis erectis , foliis subtus glauco-pubescentibus , profunde quinquelobis acutis , non subtus glabris laevissime quinquelobis obtusis , alis samararum patentibus , non approximatis. Ab *A. opulifolia* Villarsii differt foliis subtus pubescentibus , non glabris , alis samararum semipatentibus minime approximatis , ligno albo evene , haud flavo venosiore , magnitudinae , aliisque notis.

181. Atriplex diffusa. Caule herbaceo procumbente ramosissimo , foliis deltoidibus , triangulari-lanceolatisque , obtusissimis subsinuatis , calycibus fructus deltoideo-hastatis , auriculatis dentatis , disco laevi , floribus spicatis. Annua. *Prodr. pag. LVII.*

Habitat in arena litoris prope Bajas.

182. Marsilea pubescens. Foliis quaternis integerrimis pubescentibus ; fructibus sessilibus aggregatis villosis. *Prodr. sup. pag. LXX.*

Habitat in inundatis Lucaniae , in loco vulgo dicto: *Oliveto di S. Basile* , prope *Pisticcium*.

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

AD

CATALOGUM

PLANTARUM

HORTI REGII NEAPOLITANI

APPENDIX ALTERA;

CUM INTERJECTIS NONNULLARUM, NOVARUM SPECIERUM ESSENTIALIBUS CHARACTERIBUS.

A

Abies alba *Mich.*
Larix *Lam.*
pectinata *D. C.*
Acacia alba
armata *H. Kew.*
glauca
latifolia
pernambucana
suaveolens *Willd.*

A

Acaena sericea *Jacq.*
Acalypha indica
Pastoris
Acer Lobelii *Nob.* (1) *
platanoides *laciniatum*
Achillea Eupatorium
filipendulina
Gerberi

A

Achillea leptophylla *H. Vind.*
mongolica *Fischer*
myrrhifolia *H. R. Par.*
ochroleuca
odorata
pannonica †
sibirica
velutina *H. R. Par.*

(1) Foliis quinquelobis utrinque glabris, lobis acuminatis subintegerrimis undulatis, intervallis approximatis triangularibus, cortice eleganter cinereo-purpurascenti striato. *Nob.*

Planta lactescens atrovirens; arbor procera, ramis pyramidatis. Habitat in montibus dictis *dell' Avvocata*, *di Cerealto* Principatus Ulterioris. Nondum floruit in Horto Regio.

Acer platanoides, nostrae plantae affinis, differt foliis margine dentatis, dentibus acuminatis porrectis, intervallis loborum lunatis.

1819.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Achyranthes atropurpurea *Lam.*
radicans
Aconitum ochroleucum
pyrenaicum
Aeschinomene minima *H. R. Par.*
Aesculus hybrida *Bosch.*
lutea
macrostachya
Aethusa elata *Fisch.*
(Agave filamentosa. *Flor. mexic. H. R. Mat. Littaea geminiflora Bib. ital.*)
Agrimonia repens
Agrostemma nicaeensis †
Agrostis boetica *H. R. Mat.*
decumbens *Hal. fil.*
divaricata
miliacea *H. R.*
monandra *H. R. Hafn.*
vinealis *H. R. Pis.*
Aira semineutra
Allium adscendens †
Allium foetidum *M. et Bieb.*
fuscum *Wald. et Kit.*
globosum *M. Bieb.*
niveum *L.*
pratense *Schleich.*
serotinum *Schleich.*
violaceum *H. R. Ber.*
Alnus glutinosa *laciniata*
Alopecurus arundinaceus *Encycl.*
Aloe Serra *Haw.*
verrucosa *spinosa*
Althaea Ludwigii
pallida
Alyssum arenarium *Spreng.*
clypeatum
fruticosum
hirsutum *M. Bieb.*
microphyllum *H. Dorp.*
rostratum *Stevens*
Amaranthus aeneus *Nocc.*
Amaranthus capitatus *H. Vind.*
divaricatus †
gracilis *Encyc.*
hecticus
hispidus †
lividus
maximus †
polygamus *H. Vind.*
polystachyos
Ambrosinia maculata
— var. *reticulata*
Ammannia aegyptiaca *Willd. En.*
Ammi meoides
Amygdalus persica *fl. pleno*
Anagyris glauca *H. R. Mars.*
Anchusa tinctoria *
versicolor *Stev.*
Andromeda calyculata
cassinefolia
mariana
polifolia
— var. *rosmarinifolia*
serratifolia †

Androsace septentrionalis
Andryala runcinata *
Anemone sylvestris
baikalensis
vernalis
Anethum dulce
Angelica Archangelica *mosquensis Fisch.*
montana *Schleich.*
Razoulii
Anthemis artemisiaefolia *fl. aurant. mac. fl. luteo fl. roseo fl. sanguineo*
fallax *H. R. Mons.*
rigescens *Willd. En.*
Anthemis pulverulenta
tinctoria
— var. *rad. albo*
valentina *
Anthericum asphodeloides
Antholyza ringens
Anthoxanthum ovatum *H. R. Mat.*
Anthyllis eretica *Lam.*
vulneraria *fl. luteo* *
Antirrhinum medium *Curt.*
reticulatum
sempervirens *angustifolium*
Apargia aspera
aurea
lucida *Nob.* (2) *
runcinata *
Taraxaci
Apargia tuberosa *
Villarsii
villosa †
Aquilegia atropurpurea *Willd. E.*
sibirica
vulgaris *ecalcarata*
Arabis bursifolia †
caucasica *W.* (albida *Jacq.*)
saxatilis
Arctium grandiflorum
tomentosum *Pers.* (*A. Bardana Willd.*)
Argyrocheta bipinnatifida
parviflora
Armeniaca brigantiaca *Pers.*

(2) Scapo unifloro appendiculato striato glabro, calycibus glabris, foliis runcinato-pinnatifidis, laciniis divaricatis lanceolatis integerrimis obtusiusculis undulatis, terminali ovato-triangulari obtusa; radice carnosa fibris filiformibus. *Nob.*

Planta spithamea laetevirens lactescens, perennis.

Habitat in cacumine Montis militum, vulgo *Montemiletto*, in regione boreali Montis matensis in Samnio. Floret *Junio.*

An *Dens leonis alpinus delicatus tuberosus ephemero flore*, Bonanni tab. 92. ?

Vulgo : *Cicorietta del Matese.*

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

A

Armeria
denticulata
Scrhad.
Artemisia
decumbens †
desertorum †
leucanthemi-
folia *H. R.*
Par.
pauciflora
scoparia
violacea
H. R. Par.
Arundo
mauritanica *
speciosa
Schrad.
Asclepias linearis
H. R. Mat.
Asperula Aparine
M. Bieb.
hirta
montana
H.R.Berol.
erecta
H.R.Berol.
Aster aestivus *Ait.*
latifolius *Lam.*
mutabilis
pulchellus
sibiricus
B. incisus
versicolor
H. R. Par.
Astragalus
melilotoides
H. Gor.

A

Astragalus
reptans
H. R. Par.
subiliformis †
sulcatus
triangularis
H. R. Mat.
Athamantha
denudata
Fisch.
Athanasia
parviflora
Atriplex multifida
Atropa
arborescens
(*Cestrum*
campanula-
tum Lam.
Avena planiculmis
Schreb.
sempervirens
Villars
Azalea nudiflora
coccinea
papiliona-
cea
rutilans
pontica
Schreb.
serotina

B

Basella
cordifolia
Bellium
minutum

B

Berberis vulgaris
canadensis
fruct. viola-
ceo
Betonica
grandiflora
M. Bieb.
Betula lenta
pubescens
Biscutella
cichoriifolia
Lois.
megalocarpa
Fisch.
Boerhaavia
glastifolia
Boltonia asteroides
Mich.
Borago laxiflora
DC.
Brassica oleracea
sylvestris
Brignolia
pastinacaefolia
Bertol.
Bromus
alopecuroides
H. R. Mat.
angustifolius
M. Bieb.
tauricus
asper
confertus
M. Bieb.
creticus †
tectorum *
Bryonia alba

B

Bubon glaucum
H.R.Berol.
Budleja salvifolia
Bupleurum
cernuum
Nob. *

C

Cacalia cuneifolia
Cachrys
panacisfolia
Cadia purpurea
Calamagrostis
arenaria
Roth.
vulgaris
Calendula
denticulata
Willd. E.
Calycanthus ferax
Mich. (*C.*
laevigatus
Willd.)
nanus *Cels.*
praecox
Calymenia
glabrifolia
Camelia japonica
fl. pl.albo
fl.pl.rubro
fl. pl.var.

C

Camelià
Paeonia
flor.pleno
Pink
flor.pleno
Warata
flor.pleno
Campanula
Alpina
betonicaefo-
lia
M. Bieb.
carpathica
Ait.
corymbo-
sa (3) *
Elatines *
liliifolia
Lychnitis
Horn.
marsupiiflora
Fisch.
mollis *
nitida *Ait.*
persicifolia
fl. albo
punctata
speciosa
Pourr.
stylosa
Trachelioides
Bieb.

C

Capsella
ceratocarpa
Lamk. (*Le-*
pidium
Linn.)
Capsicum
pendulum
rubrum
H. Par.
Carduus
cichoraceus
Cyrilli *
crispus
giganteus
Desf. (*C.*
Gigas *Bern.ab.*
Ucria)
lappaceus
H. R. Par.
lycopifolius
(*Serratula*
heterophyl-
la Desf.)
mollis *
peregrinus
Personata
Jacq.
Carex cyperoides
lagopodioides
Linkii
maxima
H. R. Mat.

(3) Caulibus adscendentibus prostratisque flexuosis ; foliis radicalibus ovato-cordatis longissime petiolatis, glanduloso-dentatis, caulinis ovatis petiolatis, omnibus coriaceis glaberrimis; floribus corymbosis, petiolis subsimplicibus *Nobis*.
Habitat in rupibus montium Lucaniae. Floret *Julio*. Perennis.

Orto Botanico di Napoli - Biblioteca degli Studi di Napoli Federico II

C C C

Carex saxatilis
teretiuscula
Carlina
aggregata
sicula (4)
Carpinus
virginiana
Mill.
Carthamus
Carduncellus
rigidus
H. R. Mat.
Casuarina indica
Ceanothus
mexicanus
H. R. Cas.
Celastrus
Pyracanthos
Cenchrus spinifex
Centaurea
atropurpurea
— var. *flor. citrinis*
conifera
Scabiosa
italica
sordida
transalpina
Schleich.

Cerastium
dauricum
Fisch.
strictum
sylvaticum
Kit.
Cerasus bracteata
Lois. ined.
nicotianaefolia *Pall.*
Padus
pumila
Mill.
semperflorens
Willd. E.
Cerinthe major
Chaerophyllum
Cicutaria
Schleich.
aureum
Cheiranthus
dubius †
erysimoides
helveticus
Jacq.
longifolius
Vent.
rostratus
Schreb.

Chenopodium
incisum
H. R. Par.
Chondrilla
nudicaulis
Chrysanthemum
Buxburgii
H. R. Par.
frutescens
lacustre
latifolium †
maximum
— var. *caule ramoso*
serotinum
Cichorium
spinosum
Cineraria sibirica
speciosa laevigata
Cissus Ampelopsis
stans
Cistus hirsutus
H. R. Par.
monspeliensis
major
villosus
undulatus
Clematis crispa

(4) Caule simplici, apice trifloro, floribus sessilibus aggregatis, foliis pinnatifidis dentatis spinosis, supra glabris, subtus tomentosis, squamis calycinis argenteis; receptaculi paleis apice multifidis albidis flosculis superantibus. *Nob.*

Habitat Panormi ad agrorum margines. Perennis.

Invenit dilectissimus discipulus meus Johannes Gussone.

Affinis *C. involucratae*; differt vero foliis tomentosis, floribus omnibus sessilibus, radio argenteo.

C C C

Clematis maritima
Clethra alnifolia
arborea
Clinopodium
argenteum
(*H.R.P.*)
Cnicus
arachnoides
carlinoides
Fisch.
ciliatus *Murr.*
helenioides
Linn.
heterophyllus
munitus
Marsch.
neglectus
Fisch.
oleraceus
purpureus
All.
rigens
rivularis

Cnicus serrulatus
Bieb.
strigosus
M. Bieb.
Cochlearia
heterophylla
H. R. Mat.
Colchicum
autumnale
grandiflorum
Colutea aleppica
Lamk.
boetica
H. R. Mat.
Convolvulus
Boerhaavii
H. Lands.
dauricus †
farinosus
Scammonia
sibiricus
undulatus
Cav.

Conyza
geminiflora
Nob. (5) *
prostrata
Nob. (6)
Corchorus
hirsutus
Cordia Mixa
Cordylocarpus
laevigatus
Cornus alba
sibirica
alternifolia
coerulea
Coronilla
valentina
Corydalis
digitata *
Corylus Colurna
rostrata
Ait.
tubulosa
Willd. E.

(5) Suffruticosa, caule erecto paniculato, foliis elliptico-lanceolatis in petiolum attenuatis acuminatis, margine undulatis, subtus niveo-tomentosis, supra viridi-lanatis; floribus foemineis corolliferis, squamis calycinis obtusis adpressis; pedunculis longissimis geminis, altero breviore. *Nob.*

Planta caespitosa, perennis.

Habitat in collibus submaritimis ad fissuras rupium; prope Neapolim ad Sepulchrum Virgilii, supra muros, in via vulgo *salita del Vomero*, in insula Caprearum, et alibi. Floret *Julio.*

(6) Suffruticosa, caule prostrato divaricato, foliis obovato-spathulatis integerrimis, junioribus utrinque albo-tomentosis, senioribus supra virescentibus, floribus foemineis corolliferis, calycum squamae obtuse adpresse; pedunculis solitariis axillaribus. *Nob.*

Planta humifusa, parvula, perennis.

Habitat . . . . . Floret *Julio.*

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

C C D D

Crassula
linguaefolia
H.R.Cantabr.
Crataegus Aria
longifolia
Botryapium
(*Aronia Pers.*)
caroliniana
glabra
punctata
Crepis aspera
cinerea
heterophylla
Schrad.
heteroperma
Schr.
integrifolia
Schleich.
intybacea
Brot.
lodomeriensis
Besser.
pauciflora
H. R. Par.
Crinum
latifolium
Crocus luteus
Lamk.
minimus
Redout. *
odorus *
Crotalaria
chinensis
Crotalaria
laburnifolia
Cucubalus
alpinus
bassanensis
H.R. Berol.
Cupressus
Tournefortii
H. R. Par.
Cycas revoluta
Cynara
Cardunculus
hispanica
Cynoglossum
lanatum
lanceolatum
montanum
Smith. *
sylvaticum
Henk.
Cynosurus
Coracanus
indicus
pectinatus
Cyperus brizoides
H. R. Par.
bruneus
bulbosus
hexastachyos *
Cytisus
purpureus
Jacq.
Dactylis
hispanica
Willd. E.
littoralis
Dalea annua
H. R. Par.
villosa †
Daphne odora
Daucus
maritimus *
sylvestris
H. Vind.
Delphinium
discolor
Fisch.
exaltatum
montanum
Schleic.
speciosum
Bieb.
tridactylon
Dianthus
arenarius
collinus
major
Willd. E.
diutinus
Kit.
fuscatus
italicus
H. R. Par.
longicaulis
Nob. (7) *

(7) Floribus solitariis, squamis calycinis ovatis, omnibus emar-

D E E

Dianthus
montanus
Bieb.
plumarius
fl. pleno
pungens
serotinus
Willd. E.
Sternbergii
Hopp.
Digitalis
grandiflora
Lamk.
lanata
orientalis
Lamk.
Diospyros digyna
Dipsacus ferox
H. R. Par.
Dolichos aureus
H. R. M.
Dorycnium
latifolium
M. Bieb.
Draba hirta
Drepania pallida
Desf.
Echium australe
candicans
major
Jacq.
lineatum
Jacq. fil.
rubrum
Elaeagnus
orientalis
Eleusyne
pectinata
Elymus Hystrix *
racemosus
H. R. Par.
sabulosus
M. Bieb.
Epilobium rosmarinifolium *
Eragrostis
caroliniana *
Erianthus
laguroides †
Erica arbutiflora
H. Malm.
concinna
urceolaris
Erigeron annuum
laevigatum
longifolium
Erigeron Villarsii
Erodium
romanum *
Eruca vesicaria
Ervum Ervilia
alba
Eryngium
asperifolium
Laroche
siculum
Erysimum
angustifolium
canescens
Roth.
giganteum *
helveticum
Dec.
junceum
longifolium
quadrangulare
Desf.
Euphorbia
atropurpurea
Brouss.
fruticosa *Biv.*
literata *Jacq.*
littorea *Jacq.*
pallida
M. Bieb.

ginato-cuspidatis, petalis crenatis imberbibus, foliis lineari-lanceolatis crassiusculis glaucis; caule paniculato multifloro. *Nob.*

Planta caespitosa, perennis.

Dianthus sylvestris, nostrae plantae admodum affinis, differt squamis calycinis interioribus obtusissimis, foliis angustissimis rigidis atro-virentibus.

Habitat in scopulis insulae Inarimes, in collibus Camaldulensium prope Neapolim et alibi. Floret *Junio*.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

E

Euphorbia
pilulifera
Linn. (*E. capitata Enc.*)
pinifolia
Encycl.
platyphyllos
— var. *autumnalis*
Evonymus atropurpureus
Jacq.
verrucosus

F

Farsetia clypeata
H. Kew. *
Fedia rugulosa
Festuca
denticulata
distachyos
Willd. E.
pallens *Host.*
ramosa
rigida *Roth.*
vaginata *Kit.*
violacea
Gaud.
Fragaria muricata
sterilis *
Fraxinus
angustifolia

F

Fraxinus
elliptica
Bosc.
excelsior
aurea
H. R. Par.
parvifolia
sambucifolia
Fritillaria
imperialis
fl. aurantiaco duplici corona
fl. luteo
fl. rubro serotino
fl. varieg.

G

Galium lucidum
H. R. Par.
tyrolense
Willd. E.
Vaillantii
DC.
Gallinsoga
parviflora
triloba
Gaura fruticosa
Genista germanica
sphaerocarpa
Lamk.

G

Geranium
argenteum
ibericum
Cav.
maculatum
sylvaticum
umbrosum
fl. albo
Waldst. et Kit.
Ulyssipianum
Bieb.
Geum atlanticum
Desf.
canadense
heterophyllum
Fisch.
Gladiolus carneus
Jacq.
strictus
Gleditschia
senensis
Lamk.
horrida
siliqua rotunda
Glycine monoica
perennis *
reticulata
Gnaphalium
leyseroides
pompejanum
Nobis (8)
uliginosum

(8) Herbaceum; caulibus virgatis, apice corymboso-subdichotomis, foliis linearibus et obtusiusculis, utrinque albo-tomentosis, floribus spicato-glomeratis in dichotomia, capitatis in ramulorum apicibus, glomerulis 10-20 floris, ramulisque in axillis foliorum spicis floriferis serotinis onustis; calycibus ovatis, squamis oblongis obtusis laxis membranaceis argenteo-viridiquo variis splendentibus, apice non sphacelatis; flosculis tubulosis, pappis pilosis rufescentibus.
In amphiteathro pompejano primum invenit diligentissimus Comes *de Bray* Boius.
Planta sesquipedalis, annua. Floret *Martio.*

G

Gypsophila
acutifolia
Fisch.
repens

H

Haemanthus
tigrinus
Hebenstreitia
albiflora
H.R.Berol.
Hedera Helix
fol.varieg.
Hedysarum
carneum
Schleich.
capitatum
petraeum
Marsch. et Bieb.
Helianthemum
alpinum
H.R.Monsp.
carycinum *
Fumana *
lanceolatum
vulgare
latifolium *

H

Helianthemum
missuricum
Spreng.
Helianthus
altissimus
exaltatus
H.R.Berol.
indicus
linearis *Cav.*
trachelifolius
Willd. E.
Heliophylla
crithmifolia
H.R. Ber.
Helminthia
spinosa
Hemerocallis
graminea
Heracleum
elegans *Jacq.*
longifolium
Spreng.
pyrenaicum
Lamk.
Hermannia hirsuta
Hesperis
bituminosa
H. R. Par.
laxa

H

Hibiscus
laevis
pensylvanicus
H. R. Par.
Rosa sinensis
fl. simplici
syriacus
plures var.
fol. varieg.
vesicarius
Hieracium
bifidum *Kit.*
canescens
Schleich.
collinum †
coronopifolium *var. latifol. Bern.*
cydoniaefolium
Willd. E.
flexuosum
foliosum
W. et Kit.
glandulosum
H. R. Par.
Halleri
Jacquini
Vill.

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

H H I

Hieracium
longifolium *Schleich.*
ovatum *H. R. Ber.*
pictum *Pers.*
Piloselloides *Vill.*
pilosum *Schleich.*
praealtum *Willd.*
praenanthoides
prunellifolium
pyrenaicum
scabrum *H. R. Par.*
succisaefolium *All.*
villosum *valdepilosum*
virgatum *H. Vind.*

Hippocrepis
ciliata *DC.*

Horminum
virginicum

Hyacinthus
patulus *Desf.*
serotinus *Linn.*

Hydrangea nivea *Mich.*
radiata *Smith.*

Hydrangea
vulgaris (*arborescens L.*)

Hyoseris arenaria *Schousb.* *
eretica *
foetida

Hypericum
Kalmianum
pulchrum *
undulatum *Schousb.*

Hypochaeris
pinnatifida *Cyr.* *

Hyssopus discolor *H. R. Par.*
ocymifolius *Lam.*
scrophulariaefolius *Willd. E.*

I

Jacobaca
nigrescens

Iberis hirsuta *H. R. Par.*

Illycium Anisatum

Imperatoria
caucasica *Fisch.*
verticillata *Encycl.* *

Inula Vaillantii

Ipomaea hirsutula *H.R.Vind.*

Iris foetida *fol. varieg.*
pumila var.
stenogyna *Red.*
versicolor

Juglans
fraxinifolia *Lam.*
nigra
olivaeformis *Mich.* (Jugl. cylindrica *Lam.*)

Juniperus
Bermudiana
patula *H.R.Casert.*
Sabina *fol. varieg.*
thurifera

Justicia
sexangularis

K

Knautia propontica

Kaeleria subspicata *H. R. Vind.*

L

Lachenalia alba *Jacq.*

Lantana asperata

L L M

Laserpitium
hispidum *M. Bieb.*
pruthenicum

Lathyrus
ochroleucus †
speciosus *H.R. Mon.*
spurius †
tumidus *Encycl.*

Lavatera hispida *africana*
Pseudo-Olbia *Desf.*
unguiculata

Ledum palustre *angustifolium*

Leontodon
lividum *Schleich.*

Lepidium
apetalum
divaricatum
lyratum
ruderale *

Lespedeza juncea

Ligusticum
alatum *Spreng.*
athamanthoides *Spreng.*

Lilium
pomponium *aureum*
superbum
tigrinum

Limodorum
Tankervilliae

Linaria
littoralis
pyrenaica

Linum diffusum

Lithospermum
latifolium
purpureo-coeruleum*

Lonicera alpigena
canescens
coerulea

Dioscoridis
grata *Ait.* (*Peryclym. amer. Mill.*)
nigra
tatarica *rosea rubra*

Lopezia
racemosa

Lotus
corniculatus var. *alpinus*
maritimus *

Lupinus
mexicanus *Cervantes*

Lychnis dioica *fl. pleno*

Lycium chinense *Lamk.*

Lythrum Salicaria var. *tomentosum*

M

Magnolia
acuminata
auriculata
cordata
grandiflora var. *obovata*
obovata *Willd.* (*M. purpurea Curt.*)
tripetala (*M. umbrella Lam.*)
Yulan

Malope trifida

Malus
baccata
dioica *Duh.*
hybrida *Desf.* (Pyrus prunifolia *Willd.*)

Malva
borbonica *Willd. E.*
grossulariaefolia
macrocarpa *H.R.Monach.*
odorata *H. R. Par.*
Scherardiana
Tournefortiana

Marrubium
astracanicum
cuneifolium †

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

M

Marrubium
leonuroides
H.R.Mediol.
Medicago
caspica
Steven.
echinata
glutinosa
M. Bieb.
olivaeformis
Bertol.
Melaleuca
diosmaefolia
Curt.
viridiflora
angustifolia
Melica coerulea
speciosa
Willd. E.
(*M.glabra Mich.*)
Melilotus
pyrenaica †
recurva †

M

Melissa marifolia
Mentha neglecta
Nob. (9)
niliaca
perilloides
Mesembryanthemum linguaeforme
uncinatum
Mespylus axillaris
latifolia
Poir.
melanocarpa
Fisch.
Oxyacantha
flor. pleno
tanacetifolia
Poir.
tomentosa
Desf.
Metrosideros
floribunda
glauca
propinqua
H. Gor.

M

Milleria sessiliflora
H. R. Mat.
Mimosa angustisiliqua †
glomerata †
Monarda
involucrata †
mollis
H. R. Taur.
Myosotis lutea
villosa
Myrica Gale
pensylvanica
serrata
Myrrhis Cicutaria
Spr. (*Chaerophyll. L.*
Myrtus communis
fl. pleno
Pymenta

N

Narcissns laetus
patulus ? *DC.*

(9) Spicis brevibus ovato-oblongis, e verticillis congestis; foliis subrotundis amplexicaulibus, apice rotundato-crenatis rugosis, subtus canescentibus, summis exquisite orbiculatis; staminibus corolla longioribus, bracteis linearibus, verticillis aequantibus. *Nob.*

Habitat ad margines agrorum in fossis aquosis, ad Sebetum. Floret *Augusto*. Perennis.

M. rotundifolia et crispa a nostra differunt spicis gracilioribus longissimis e verticillis distinctis, foliis ellipticis argute serratis, staminibus corollam aequantibus.

M. macrostachya nostrae plantae magis affinis, differt tamen foliis ellipticis argute serratis.

An omnes sub nomine *Menthae polymorphae* in unam speciem colligendae?

N

Narcissus
Pseudo-Narcissus
fl. pleno
Nepeta argentea
H.R.Panor.
botryoides
Willd. E.
(*N. bipinnata Cav.*)
crispa
imbricata
H. R. Mat.
incana
lanceolata
Lamk.
multifida *althaica*
H. Gor.
Nepetella
Nerium Oleander
var. *splendens*
Willd. E.

O

Ocymum
micranthum
Willd. E.
Oenanthe
apiifolia
Oenothera
salicifolia
H. R. Par.
Onobrychis
procumbens
Fisch.
Ononis
arborescens
Desf.
parviflora
reclinata
Onopordon
macrocanthum
viscosum
H.R.Berol.
Ophrys aranifera *
ciliata *Cav.* *

O

Ophrys
cordata *
distoma *
grandiflora
Nob. (10) *
exaltata
Nob. (11) *
lutea *
picta *
Orchis fusca
var. *moravica* *
longicornis *
Pseudo-Sambucina
Nob. *
fl. luteo Nob.
undulatifolia
Biv. *
Ornithopus
sativus
Oxalis caprea
fl. pleno

(10) Caule folioso, labello villoso amplissimo dilatato quadrato, latere inferiori emarginato appendiculato; lateralibus undulatis ad basin sinuatis, gibbis coarctatis; disco in medio convexo, ad basin glaberrimo, areola nitida fascia duplici, interiore fusca, exteriore lutea, superficiem totius labii ambientibus circumscripta; petalis tribus exterioribus subrotundis expansis, binis interioribus ovatis brevissimis, omnibus laete rubris; bracteis longitudine germinis viridi-rubroque variis.

Habitat in nemoribus *Silae* Calabriae Ulterioris, in montibus Nebrodensibus Siciliae. Floret *Martio*. Perennis.

(11) Caule folioso, labello villoso obovato convexo, apice integro appendiculato, ad basin bilobo, lobis prominulis, margine undulato-crispo, disco fusco, lineis glaberrimis inscripto, petalis tribus exterioribus oblongo-linearibus obtusis, binis interioribus dimidio brevioribus, undulato-crispis pallide luteis; bracteis germine longioribus.

Habitat cum praecedente. Floret *Martio*. Perennis.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

O

Oxalis dentata
hirtella *Jacq.*
incarnata
livida *Jacq.*
miniata
rosacea *Jacq.*

P

Paeonia albiflora Russi *Biv.*
Paliurus aculeatus
Pancratium carolinianum
narcissiflorum *Jacq.*
Panicum alopecuroides
asiaticum *glaucum*
Crus-galli *fol. macul.*
debile
erythospermum *H. Hafn.*
miliaceum *album*
pilosum
plicatum
Paspalum Digitaria *Encycl.*
Patrinia serratulaefolia *Fisch.*

P

Pavonia pilosa
Pelargonium bicolor
Pelargonicum Curtisianum *Hortul.*
fragrans *Willd. E.*
grandiflorum
Heritieri *H.R.Vind.*
heterogamum
hirsutum
semitrilobum
ternatum
triphyllum
zonale *fl. albo*
Peucedanum alpestre *H.B.Berol.*
Phalaris arundinacea *picta*
aspera
bulbosa *
Phaseolus biflorus *
capensis *alb. H. Panor.*
dimidiatus *H. Panor.*
niger *H. Panor.*
nigerrimus *H. Panor.*
perennis

P

Phaseolus rotundus †
sinensis *H. Paris.*
sphaerospermus
Phleum Boemeri *Willd. E.*
Phlomis caribaea
Samia
Phlox alba
Phyladelphus inodorus
Phyteuma spicatum
Pimpinella peregrina *taurica*
Pinus altissima *L.* (P. *Laricio Desf.*)
Piper lucidum
trifoliatum
Pistacia narbonensis
Pittosporum coriaceum
sinense *Desf. H.R.P.*
Planera aquatica (P. *ulmifolia Mich.*)
Richardi
Plantago Cornuti
mexicana *H. R. Ber.*
patagonica

P

Plantago sericea
Poa aspera *Gaud.*
coarctata *Hall. fil.*
maritima
nervata
rubens
ruthenica †
sterilis *Stev.*
virens *Porsh.*
Polygala myrtifolia
Polygonum Laxmanni *Leipech.*
Polymnia abyssinica
Polypogon fasciculatum
Populus graeca
heterophylla
monilifera ?
virginiana
Potentilla adscendens *Willd. E.*
agrimonioides
calabra *Nob.* *
canescens *
crocea *Schleich.*
geoides *Bieb.*
Güntheri *Spreng.*

P

Potentilla pedata *Willd. E.*
pyrenaica *Dec.*
rubens
rubricaulis †
Pothos lanceolata
Praenanthes tenuifolia *Schleich.*
Protea hirta
pallens
Prunella alba *H.R.Berol.*
hirta *Bernh.*
Prunus cerasifera
Cerasus *fl. pleno*
Mahaleb *fruct. flavo*
Punica Granatum *fl. luteo*
nana
Pyrethrum frutescens
latifolium *Willd. E.*
millefoliatum roseum *M. Bieb.*
sericeum *Marsch. et Bieb.*
tomentosum *H. Monach.*
Pyrus amygdaliformis *Villars*

P

Pyrus japonica *fl. roseo*
Sinai *Desf.*

Q

Quercus fastigiata *Lamk.*
macrocarpa *Mich.*
Toza *Bosch.*

R

Ranunculus millefoliatus *
nemorosus *Dec.*
pedatus *Rit.*
pensylvanicus
repens *var.*
spicatus
Rhamnus Frangula *var.* Lotus
Rhododendron caucasicum †
punctatum *Vent.*
Rhotia cheiranthifolia *
Rhus Oxyacanthoides (*R. ziziphynus H.R.Pan.*)
Vernix
viminale

Orto Botanico di Napoli - Università degli Studi di Napoli Federico II

Ribes alpinum
Grossularia
plur. var.
Ricinus communis
violaceus
Robinia
Halodendron
mollis
M. Bieb.
Pseudo-Acacia *crispa*
spectabilis
Rosa althaica
bifera *semperflorens*
bracteata
burgundiaca
centifolia
crispa
kinston
muscosa
alba
unica alba
vilmorina
gallica *atropurpurea*
hybrida
Schleich.
inermis
Dupont
montana
Vill.
multiflora
myriacantha
Dec.
parviflora
Ehrh.
Rosa
semperflorens
pumila
turbinata
Ait.
Rubus canadensis
fruticosus
fl. pleno
hybridus
Willd. (*R. glandulosus Bell.*)
Rudbeckia alata
Rumex aculeatus
aegyptiacus
campestris
H.R.Pan.
dentatus
digynus
lacerus
H.R.Vind.
vesicarius

S

Saccharum
argenteum
Jacq. fil.
Salix aquatica
monandra *
Salsola muricata *
Salvia angustifolia
betonicaefolia
Clusii *Jacq.*
foetida *Desf.*
grandiflora
pendula *Desf.*
Salvia
phlomoides
Vahl.
serotina
Sambucus nigra
var. fruct. albo
Santolina
rosmarinifolia
var. minor
Saponaria illyrica
Satureja montana
vera *
rupestris
Saxifraga calyciflora
Lapeyr. (*S. porophylla Berb.*) *
Cotyledon
Scabiosa amoena
Jacq. fil.
gramuntia
mollis
montana
Bieb.
pubescens
Rit.
sylvatica
Schollia speciosa
Jacq. fil.
(*Asclepias carnosa Willd.*)
Scilla campanulata
fl. albo
Scorzonera
glastifolia

Scorzonera
radiata
Fisch.
taurica *Bieb.*
tingitana
Desf.
Scrophularia
variegata
Secale prostratum
Selinum sibiricum
Senecio
declinatus
nigrescens
rigidus
squalidus
Serapias
sylvatica *
Seriola alliata
Biv.
cretensis
Serissa foetida
fl. pleno
Serratula alata
arguta *Fisch.*
heterophylla
Seseli rigidum
tortuosum
Bieb.
Sesleria elongata
Host.
Sida betulina †
deflexa *Cav.*
grandifolia
Willd. E.
peruviana †
tiliaefolia
Fisch.
Sideritis alpina
hirsuta
H.R.Vind.
Sideroxylon
multiflorum
Sigesbeckia
iberica
M. Bieb.
Silene alpestris
anglica
Atocion
catholica
colorata
Schousb.
glutinosa
(*Cucubalus catholicus Lin.*). *
geminiflora
Willd. E.
imbricata ?
infracta *Kit.*
Loefflingii
marginata
Schott. fil.
nemoralis
Schult.
nycthanta
Willd. E.
obtusifolia
Willd. E.
patula †
polyphylla
Dec. Fl. fr.
(*S. inaperta Linn.*)
retrohirsuta †
Silene saponariaefolia
Schott. fil.
sericea
supina *Bieb.*
sylvestris
Schott. fil.
Silphium
conjunctum
Sinapis laevigata
nigra *torulosa*
pyrenaica
Sisymbrium
acutangulum
Schleich.
palustre
subhastatum
H. R. Mat.
sylvestre
Sisyrinchium
racemosum
Sium Falcaria
siculum
Solanum
coccineum
Jacq.
cornutum
giganteum
Jacq.
Sonchus lacerus
Plumieri
Sophora
occidentalis
tomentosa
Sorbus
americana
intermedia

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

S

Spartium
aethnense
Biv.
Spigelia
anthelmia
Spiraea
sorbifolia
tomentosa
ambigua
anguina
articulata
clypeata
conspurcata
Stapelia hirsuta
hirtella
incarnata
maculosa
picta
replicata
retusa *Jacq.*
tridentata
trisulca
Statice Gmelini
Stevia serrata
var. *subhirsuta*
Stipa paleacea
Strelitzia
juncea
(*ex hortis anglicis*)
Reginae
Symphitum
orientale
Syringa dubia
alba

T

Tagetes
coronopifolia
Thalictrum
ambiguum
Spreng.
aquilegifolium
atropurpureum
Jacq. *
contortum
dichotomum
H.R. Mon.
divaricatum
Spreng.
flexuosum
H.R.Vind.
glaucescens
Willd.
laserpitiaefolium
H. R. Ber.
polygamum
Spreng.
purpurascens
simplex
speciosum
var. *latifolium* *
squarrosum
trigynum
Fisch.
Thea viridis
Thlaspi alpinum
Thumbergia
capensis?
Thymbra spicata

T

Thymus villosus
Tilia alba
var. *tomentosa*
glabra *Vent.*
(*T. americana L.*)
pubescens
Ait.
rubra *Dec.*
Tolpis quadriaristata *Biv.*
Tormentilla
erecta *
Tradescantia
undulata
Willd. E.
Trifolium
cristatum
Schreb.
Cupani
Tin. fil.
Lupinaster
purpurascens
Melilotus
flor. albo
pallidum
strictum
suaveolens
Willd. E.
Trigonella
striata
spinosa
Triticum
pruinosum
H. R. Ber.
unioloides

T

Triticum
variegatum
Pursh.
Zea *Host.*
Tropaeolum
majus
fl. pleno
Turritis
alpestris
Schleich.
scabra †

U

Ulmus chinensis
Desf.
effusa
Urena sinuata

V

Vanilla
planifolia
Ait.

V

Verbascum
pyramidatum *Bieb.*
repandum
Willd. E.
speciosum
Schrad.
Veronica
brevifolia
Kit.
caucasica
Bieb.
Crista-galli
Steven.
elatior *Ehrh.*
exaltata
H.R.Vind.
glabra
Schrad.
longibracteata *M.Bieb.*
multifida
polymorpha
H. R. Ber.

V

Viburnum Opulus
fl. roseo
rugosum
Vicia glabra
M. Bieb.
lutea
megalosperma *M.Bieb.*
pisiformis
Vinca minor
fl. pleno
fl. violaceo
Viola stricta

W

Wedelia
ovatifolia
Westia lycioides

Z

Zuccagnia viridis.

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II

Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II